

2.5 毫米；苞片卵形，长 1—1.2 毫米，宽 0.6—0.8 毫米；花黄色；外萼片卵形，长 1.6—1.8 毫米，宽 1—1.1 毫米，中萼片倒卵状长圆形，长 3.7—3.8 毫米，宽 1.7—1.8 毫米，内萼片倒卵形，长约 4 毫米；花瓣椭圆形，长 3.5—3.6 毫米，宽 1.3—1.4 毫米，基部具 2 枚明显腺体，先端微缺裂；雄蕊长约 2.1 毫米，药隔延伸，顶端圆形；子房长约 1.7 毫米，花柱长 0.3—0.5 毫米，胚珠 2 枚。浆果不详。花期 10—11 月。

产于广西。模式标本采自广西植物研究所植物园。

本种近似亮叶十大功劳 *Mahonia nitens* Schneid.，但本种小叶 3—4 对，最下一对小叶距叶柄基部 3—4 厘米，顶生小叶无叶柄；花序长 3—8 厘米。易于区别。

### 11. 刺齿十大功劳

*Mahonia setosa* Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France 55 (4ser. 8): 86, 1908; Ahrendt in Journ. Linn. Soc. Bot. 57 : 328, 1961; 云南植物志 7 : 27, 1997.

灌木，高约 1.5 米。叶长约 25 厘米，宽约 14 厘米，具 4—8 对小叶，最下 1 对小叶距叶柄基部 2.5—3.5 厘米，上面暗绿色，背面淡黄绿色，干后金黄色，基出脉 3 条，叶脉网状，两面叶脉隆起，叶轴细弱，粗约 1—2 毫米，节间长 1—2 厘米；小叶披针形至线状披针形，薄纸质，长 1.8—8 厘米，宽 0.8—1.2 厘米，基部楔形，叶缘每边具 8—20 纤细刚毛状刺齿，刺齿长 3—4 毫米，先端渐尖。总状花序 3—5 个簇生，长 3—5 厘米；芽鳞狭三角形，急尖；花梗细弱；苞片披针形；花长 4—5 毫米；外萼片狭三角形，先端锐尖，中萼片和内萼片披针形，近等大；花瓣稍短于内萼片，基部渐狭，具 2 枚明显腺体，先端微凹；药隔延伸，顶端圆锥状；子房圆锥状，胚珠 2 枚。花期 10 月。

产于云南、四川。只看到模式标本小叶片。根据原描写本种总状花序长 3—5 厘米，近似短序十大功劳 *M. brevinacema* Y. S. Wang et Hsiao，但本种小叶线状披针形，宽 0.8—1.2 厘米，两面叶脉隆起而不同。本种叶形近似安坪十大功劳 *M. eurybracteata* subsp. *ganpinensis* (Lévl.) Ying et Boufford，但本种小叶边缘每边具 8—20 细刺齿；花序长 3—5 厘米；苞片、中萼片和内萼片披针形；药隔延伸。易于区别。

### 12. 鄂西十大功劳

*Mahonia decipiens* Schneid. in Sargent, Pl. Wils. 1 : 379, 1913; Ahrendt in Journ. Linn. Soc. Bot. 57 : 329, 1961; 湖北植物志 1 : 397, 图 561, 1976.

灌木，高 1—2 米。叶椭圆形，长 15—20 厘米，宽 7—11 厘米，具 2—7 对小叶，最下一对小叶距叶柄基部 4—6 厘米，上面暗绿色，背面淡暗绿色，两面叶脉少分枝而稍隆起，叶轴粗约 2 毫米，节间长 2.5—3.5 厘米；小叶有时邻接，卵形至卵状椭圆形，最下一对小叶长 3—5.5 厘米，宽 1.5—3 厘米，向上渐大，长 4.5—7 厘米，宽 2.5—3.5 厘米，基部近截形，边缘每边具 3—6 刺锯齿，先端急尖，顶生小叶较大，长 7.5—9.5 厘米，宽 3.5—5 厘米，柄长 1.5—2 厘米。总状花序单 1 或 2 个簇生，长 4—6 厘

米；芽鳞卵形或狭卵形，长1—1.5厘米，宽4—7毫米；花梗长2.5—3毫米；苞片卵形，长2—2.5毫米，宽约1.5毫米；花黄色；外萼片卵形，长2.3—2.5毫米，宽1.5—2毫米，中萼片阔卵形，长3—3.5毫米，宽2—2.5毫米，内萼片椭圆形，长5—6毫米，宽3—4毫米；花瓣倒卵形，长5—5.5毫米，宽3.2毫米，基部腺体显著，先端微缺裂；雄蕊长约3毫米，药隔不延伸，顶端平截；子房长约2.5毫米，花柱长约0.3毫米，胚珠2枚。浆果不详。花期4—8月。

产于湖北。生于山坡林中或灌丛中。海拔850—1500米。模式标本采自长阳。

根可作黄色染料。也可供药用。

### 13. 景东十大功劳

**Mahonea paucijuga** C. Y. Wu ex S. Y. Bao in Acta Phytotax. Sin. **25** (2): 152, 图2, 1987; 云南植物志7: 16, 1997.

灌木，高1—3米。叶卵形，长17—30厘米，宽10—15厘米，具2—3对小叶，最下一对小叶距叶柄基部2—8厘米，上面深绿色，网脉扁平，显著，背面淡黄绿色，网脉明显隆起，叶轴粗2—3毫米，节间长3—5厘米；小叶具短柄，厚革质，近等大，长圆状卵形或椭圆形，长6—12厘米，宽2.5—5.5厘米，基部阔楔形，不偏斜，边缘每边具6—16刺齿，先端渐尖或骤尖，顶生小叶具柄，长约2厘米。总状花序4—6个簇生，长4—6厘米；芽鳞卵形，长约1厘米，宽约0.6厘米；花梗长4—5毫米；苞片线状披针形，长8—12毫米，先端长渐尖；花黄色；外萼片长三角形，长约5毫米，中萼片椭圆形，长约6毫米，宽约3毫米，先端圆形，具3条脉纹，内萼片长圆形，长约5毫米；花瓣长圆形，长约5毫米，宽约2.4毫米，基部腺体显著，先端深缺裂，裂片圆形；雄蕊长约3毫米，药隔不延伸，顶端截形；子房长约3毫米，无花柱，胚珠2枚。浆果长椭圆形，长约4毫米，微被白粉，无宿存花柱。花期4—5月，果期5—7月。

产于云南。生于山坡疏林中或路旁。海拔2500—3000米。模式标本采自景东。

### 14. 十大功劳 图版44: 1—9

**Mahonia fortunei** (Lindl.) Fedde in Bot. Jahrb. Syst. **31**: 130, 1910; Ahrendt in Journ. Linn. Soc. Bot. **57**: 328, 1961; 湖北植物志1: 396, 图559, 1976; 中国高等植物图鉴1: 778, 图1555, 1972; 浙江植物志2: 309, 图2, 408, 1992. — *Berberis fortunei* Lindl. in Journ. Roy. Hort. Soc. 1: 231, 1846. — *Mahonea fortunei* var. *szechuanica* Ahrendt in Journ. Linn. Soc. Bot. **57**: 328, 1961, syn. nov.

灌木，高0.5—2(—4)米。叶倒卵形至倒卵状披针形，长10—28厘米，宽8—18厘米，具2—5对小叶，最下一对小叶外形与往上小叶相似，距叶柄基部2—9厘米，上面暗绿至深绿色，叶脉不显，背面淡黄色，偶稍苍白色，叶脉隆起，叶轴粗1—2毫米，节间1.5—4厘米，往上渐短；小叶无柄或近无柄，狭披针形至狭椭圆形，长4.5—14厘米，宽0.9—2.5厘米，基部楔形，边缘每边具5—10刺齿，先端急尖或渐尖。总状