

4. 云南八角莲 (植物分类学报)

Dysosma aurantiocaulis (Hand.-Mazz.) Hu in Bull. Fan. Mem. Inst. Biol. Bot. 8 : 37, 1937; Ying in Acta Phytotax. Sin. 17 (1): 19, 1979. 横断山区维管植物上册: 558, 1993; 云南植物志 7 : 4, 1997. — *Podophyllum aurantiocaulis* Hand.-Mazz. in Anz. Akad. Wiss. Wien. 61 : 163, 1924. — *Podophyllum mairei* Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. 85 : 167, 1938. — *Dysosma furfuracea* S. Y. Bao in Acta Phytotax. Sin. 25 (2): 155, 图 5, 1987. syn. nov.

多年生草本, 植株高 30—50 厘米。根状茎粗短, 棕褐色, 横走, 多须根; 茎直立, 直径约 3—5 毫米, 淡桔黄色, 具条棱, 无毛。叶薄纸质, 互生, 盾状, 轮廓近圆形或肾形, 叶形多样, 直径 15—25 厘米或长 7—8 厘米, 宽 13—15 厘米, 5—8 浅裂, 上面深绿色, 无毛, 背面淡绿色, 沿脉被膜质糖秕状小鳞片, 有时混生柔毛, 边缘具稀疏腺齿, 有时具细柔毛; 下部叶柄长 12—22 厘米, 上部叶柄长 3—7 厘米, 具纵条棱。花 2—5 朵簇生, 着生于远离叶基部 3—7 厘米处; 花梗长 3—6 厘米, 下弯, 无毛; 花暗紫色或粉红色; 萼片 6, 狭长圆形, 长 10—12 毫米, 宽 4—5 毫米, 无毛; 花瓣 6, 倒卵形或近圆形, 长 14—16 毫米, 宽 10—12 毫米, 先端圆形; 雄蕊 6, 长约 6 毫米, 花丝扁平, 较花药短, 花药顶端圆钝, 药隔先端不延伸; 雌蕊长约 8 毫米, 子房近圆球形, 花柱短, 约 1 毫米, 柱头盘状, 边缘皱波状。浆果近球形, 未熟果淡绿色, 直径约 8 毫米。种子多数。花期 5—6 月, 果期 6—8 月。

产于云南。生于落叶阔叶林下。海拔 2800—3000 米。模式标本采自怒江—独龙江分水岭。

根状茎有散结活瘀, 消肿止痛, 解毒清热之疗效。

5. 六角莲 (中国高等植物图鉴)

Dysosma pleiantha (Hance) Woodson in Ann. Missouri Bot. Gard. 15 : 339, Pl. 46, 1928; Hu in Bull. Fan. Mem. Inst. Biol. Bot. 8 : 36, 1937; Fl. Taiwan 2 : 521, Pl. 396, 1976; Ying in Acta Phytotax. Sin. 17 (1): 19, 1979; 湖北植物志 1 : 401, 图 566, 1976; 河南植物志 1 : 501, 图 643, 1981; 福建植物志 2 : 49, 1985; 浙江植物志 2 : 319, 图 2—423, 1992. — *Podophyllum pleianthum* Hance in Journ. Bot. 21 : 175, 1883. — *P. chengii* Chien in Contr. Biot. Lab. Sci. Soc. China 10 : 108, 1936. — *P. ontzoi* Hayata in Icon. Pl. Form. 5 : 2, 1915. — *P. hispidum* Hao in Fedde. Repert. Nov. Sp. 36 : 233, 1934.

多年生草本, 植株高 20—60 厘米, 有时可达 80 厘米。根状茎粗壮, 横走, 呈圆形结节, 多须根; 茎直立, 单生, 顶端生二叶, 无毛。叶近纸质, 对生, 盾状, 轮廓近圆形, 直径 16—33 厘米, 5—9 浅裂, 裂片宽三角状卵形, 先端急尖, 上面暗绿色, 常有光泽, 背面淡黄绿色, 两面无毛, 边缘具细刺齿; 叶柄长 10—28 厘米, 具纵条棱, 无