

淡黄色，花药瓣裂，花丝扁平，短于花药；雌蕊斜圆柱形，花柱长约1毫米。蒴果斜圆柱状，无毛，宿存花柱喙状。花期4—5月，果期6—7月。

产于贵州。生于沟谷两侧。海拔约1100米。模式标本采自贵州婺川。

2. 小叶淫羊藿 图版 56: 8—9

Epimedium parvifolium S. Z. He et T. L. Zhang in *Guihaia* **14** (1): 25, 1994.

多年生草本，植株高15—25厘米，光滑无毛。地下根茎横走，直径1.5—3毫米，长15厘米以上。单叶基生和茎生，阔心形，长2.5—3.5厘米，宽3—4厘米，先端渐尖，基部心形，两侧近相等，边缘具锯齿，上面暗绿色，光滑无毛；背面疏被短柔毛，网脉显著，常被白粉；花茎具叶1枚，与花序梗对生。总状花序长8—10厘米，具8—12朵花，花序轴无毛；花梗长1—2厘米，光滑无毛；苞片卵形，长约1.5毫米；花紫色；萼片8，2轮，外萼片4，紫色，其中2枚披针形，长约3毫米，宽约1.2毫米，另2枚卵形，长约3.5毫米，宽约2.5毫米，内萼片4，披针形，黄色，长约3毫米，宽约1.2毫米，花瓣4，近圆形，紫色，长约1.2毫米，无距；雄蕊4，长约2.5毫米，花药长1.8毫米，顶端钝尖，花丝扁平；雌蕊长约2毫米，花柱长约1毫米。蒴果长约1厘米，宿存花柱长约3毫米。种子1—2颗，肾形，褐色，长约3.5毫米。花期4—5月，果期5—6月。

产于贵州。生于松林下或灌丛中。海拔1300—1400米。模式标本采自贵州松桃县甘龙。

3. 竹山淫羊藿


Epimedium zhushanense K. F. Wu et S. X. Qian in *Acta Phytotax. Sin.* **23** (1): 71—72, 图1, 1985.

多年生草本，植株高40—60厘米。根状茎粗短；花茎圆柱形，基部被棕色鳞片。单叶基生和茎生，茎生叶对生；叶片长圆形至近圆形，长10—14厘米，宽7—11厘米，先端钝，基部心形，两侧近相等，边缘有不规则齿裂，上面深绿色，无毛，背面密被厚而细的绢丝状绒毛；叶柄长5.5—6厘米，无毛。总状花序长约30厘米，花序轴及花梗均被腺毛；花梗长1.5—5厘米；苞片卵形，长约2毫米；花紫色；萼片1轮，4枚，花瓣状，卵状披针形，长9—11毫米，宽约3.5毫米，先端钝；花瓣4，紫色，长约17毫米，囊状，基部呈兜形，顶端长渐狭；雄蕊4，长约4毫米，花药瓣裂，裂瓣外卷，顶端突尖，花丝扁平，短于花药；子房一侧略增厚，花柱长约2.5—3毫米，柱头4齿裂或不明显。果未见。花期6—7月。

产于湖北西北部。生于林下或路边。海拔1200米。模式标本采自湖北竹山。

4. 腺毛淫羊藿

Epimedium glandulosopilosum H. R. Liang in *Acta Phytotax. Sin.* **28** (4): 323, 图3, 1990.



图版 56 1—7. 单叶淫羊藿 *Epimedium simplicifolium* Ying 1. 植株; 2. 外萼片; 3. 内萼片; 4. 花瓣; 5. 雄蕊; 6. 雌蕊; 7. 果实。8—9. 小叶淫羊藿 *E. parvifolium* S. Z. He et T. L. Zhang: 8. 植株上部; 9. 花瓣。

(冀朝祯绘)