

产于四川。生于山坡草丛中。海拔 1700 米。模式标本采自茂汶。

本种与产于同一地区的茂汶淫羊藿 *Epimedium platypetalum* K. Meyer 相近似，但后者花瓣无距；小叶 5 或 3 枚。易于区别。据 W. T. Stearn 记述 (1995)，M. Ogisu 在同一地点于 1992 年采得二号标本 (Ogisu 92022; 92023)，植株高 23—40 厘米；小叶先端渐尖；花茎具 2 叶；花序具 5—11 朵花。他认为同属本种，但我们没有看到标本。

18. 水城淫羊藿

Epimedium shuichengense S. Z. He in Acta Bot. Yunn. **18** (2): 209, 图 1, 1996.

多年生草本，植物高 15—30 厘米。地下根状茎横走，长 15 厘米以上，直径 1.5—2.5 毫米。一回三出复叶基生和茎生，基生叶叶柄长 10—17 厘米，茎生叶叶柄长 3—6 厘米；小叶卵形，长 4—5.5 厘米，宽 2—2.5 厘米，先端长渐尖，基部深心形，顶生小叶基部两侧裂片近相等，侧生小叶基部两侧明显偏斜，上面深绿色、光滑，背面被贴生白色细柔毛，叶缘具细刺齿；花茎具 2 枚对生叶。总状花序长 6—7 厘米，具 6—9 朵花，序轴和总梗无毛；花梗长 1—1.5 厘米，无毛或被稀疏腺毛；苞片阔披针形，长约 1.5 毫米，中部以上边缘具刺齿；花直径约 1 厘米；萼片 2 轮，外萼片 4，披针形，长约 5 毫米，宽约 2 毫米，紫色，内萼片 4，卵形，长约 4 毫米，宽约 3 毫米，淡黄色；花瓣 4，距长 4—5 毫米，内弯，瓣片高约 4 毫米，黄色；雄蕊长约 4 毫米，花丝长约 2 毫米；雌蕊长约 4 毫米，花柱长约 2 毫米。蒴果长约 10 毫米，宿存花柱长约 3 毫米。花期 4—5 月，果期 5—6 月。

产于贵州。生于山坡灌丛中。海拔 1800 米。模式标本采自贵州水城。

19. 紫距淫羊藿 (新拟)

Epimedium epsteinii Stearn in Kew Bull. **52** (3): 662, Fig. 3, 1997.

多年生矮小草本，植株高约 15 厘米。匍匐地下根状茎细长，直径约 2—3 毫米，多须根。一回三出复叶基生和茎生，具 3 枚小叶；小叶革质，狭卵形，长 4—5 厘米，宽 2—3 厘米，先端渐尖，基部心形，顶生小叶基部裂片圆形，近等大，侧生小叶基部裂片偏斜，内裂片较小，圆形，外裂片较大，急尖，上面深绿色，无毛，背面苍白色，疏生平卧细毛，叶缘具细密刺齿；花茎具 2 枚对生叶或具 1 叶。总状花序具 6—15 朵花，长约 6 厘米或更长；花梗长约 3 厘米，无毛；花大，直径约 3 厘米；萼片 2 轮，外萼片近圆形，上部边缘波状，长 2.5—3.5 毫米，淡绿色，早落，内萼片卵形，先端急尖，长约 13 毫米，宽约 9 毫米，白色；花瓣稍长于内萼片，呈钻状距，伸长，稍弯曲，淡紫色，长约 15—16 毫米，基部瓣片紫色，高约 5 毫米；雄蕊长约 4 毫米，不外露，花丝长约 0.5 毫米；雌蕊长约 4.2 毫米，花柱长约 3 毫米。果未见。花期 4 月。

产于湖南。生于林缘或河边阴处。海拔 400—1000 米。模式标本采自湖南天平山。