

3—4 毫米，花丝长约 7 毫米，扁平，花药瓣裂，裂片外卷，顶端钝尖；子房圆柱形，长约 5 毫米，花柱略短于子房。蒴果长 1.5—2 厘米，宿存花柱长约 5 毫米，喙状。花期 4—5 月，果期 5—8 月。

产于四川、云南。生于林下、灌丛中、岩石上或河边杂木林。海拔 1400—3000 米。模式标本采自四川宝兴。

28. 长蕊淫羊藿 (新拟)

Epimedium dolichostemon Stearn in Kew Bull. **45** (4): 685, Fig 1, 1990.

多年生草本，植株高约 30 厘米。地下茎短而横走。一回三出复叶基生和茎生，具 3 枚小叶；小叶革质，卵状披针形或披针形，长达 8 厘米，宽达 3 厘米，先端渐尖，基部深心形，两侧裂片近相等，分离，先端急尖，侧生小叶基部裂片极不相等，先端渐尖，上面深绿色，背面光滑无毛，叶缘具稀疏刺锯齿；花茎具 2 枚对生复叶。圆锥花序长约 15 厘米，具花约 38 朵，无总梗，无毛；花梗长 1—1.5 厘米，光滑无毛；花小；萼片 2 轮，外萼片早落，长 2.5—3 毫米，内萼片狭椭圆形，白色，长 8—9 毫米，宽约 2.5 毫米；花瓣较内轮萼片短，紫红色，长约 3 毫米，短距内弯，先端圆钝；雄蕊明显伸出花瓣，长约 8 毫米，花丝淡黄色，长 4.5—5 毫米，花药长约 2.5 毫米，瓣裂，外卷，药隔先端突尖。果未见。花期 4 月。

产于四川。生境不详。模式标本为栽培品。此种植物由 Mikiyori Ogisu 从四川石柱引入英国 (时间不详)，栽培于 Washfield Nursery, Hawkhurst, Kent England. 并定名为 “*E. fargesii* Franchet”，1989 年 Elizabeth Strangman 将此植物活材料传给 W. T. Stearn. 他据此材料命名为 *E. dolichostemon* Stearn.

Stearn 发表此新种时 (1990)，将其产地误写为四川峨眉山，之后，M. Ogisu 写信告知 Stearn，实为四川石柱县。特附记于此。

在中国淫羊藿属种类中，只有本种和川鄂淫羊藿 *E. fargesii* Franch. 的花丝长于花药。但后者为总状花序；内萼片长 15—18 毫米，反折，距不弯曲，而前者圆锥花序；内萼片长 8—9 毫米，平展；距高度弯曲。易于区别。

29. 直距淫羊藿 (新拟) 图版 64: 7—13

Epimedium mikiyorii Stearn in Kew Bull. **53** (1): 214, Fig. 2, 1998.

多年生草本，植株高 30—40 厘米。匍匐根状茎粗短。一回三出复叶基生和茎生，具 3 枚小叶；小叶革质，披针形，长 8—11 厘米，宽 3—4 厘米，先端长渐尖，基部心形，顶生小叶基部裂片圆形，对称，侧生小叶基部高度偏斜，外裂片急尖，远较内裂片大，上面暗绿色，无毛，背面苍白色，光滑无毛，叶缘具细密刺齿；花茎具 2 枚对生叶。圆锥花序长约 18 厘米，约具 30 朵花，无毛；花梗长约 1 厘米；花大，紫红色；萼片 2 轮，外萼片长圆形，长约 3.5 毫米，早落，内萼片椭圆形，长 11—12 毫米，宽 4—5.5 毫米，带红色；花瓣呈钻状距，远较内萼片长和狭，紫色，长 1.7—2 厘米，几