

米，宽 1.5—8 毫米，先端钝；花瓣呈角状距，淡黄色，向内弯曲，基部浅杯状，有时基部带紫色，长 0.6—2 厘米；雄蕊长约 5 毫米，花丝长约 1 毫米，花药长约 4 毫米，瓣裂，裂片外卷；雌蕊长约 5 毫米，子房斜圆柱状，有长花柱，含胚珠 10—12 枚。蒴果长约 1.5 厘米，宿存花柱喙状。花期 4—5 月，果期 5—6 月。

产于四川、贵州、湖北、广西。生于林下、灌丛中、草丛中或石缝中。海拔 300—1700 米。模式标本采自四川巫山。

32. 星花淫羊藿（新拟）

Epimedium stellulatum Stearn in Kew Bull. **48** (4): 810, Figs. 1&2, 1993.

多年生草本，植株高 20—35 厘米。地下茎短而横走。一回三出复叶基生和茎生；小叶革质，卵形，长 8—9 厘米，宽 4—7 厘米，先端急尖或短渐尖，基部深心形，两侧裂片近相等，急尖，相互分离，侧生小叶基部裂片不等，上面暗深绿色，有光泽，背面明显被短柔毛，叶缘具多数刺锯齿；花茎通常具 2 枚对生复叶，偶仅 1 枚。圆锥花序长 15—20 厘米，无总梗，具 20—40 朵花；花梗长 5—15 毫米，密被腺毛；小苞片先端短渐尖，长约 2.2 毫米；花小；萼片 2 轮，外萼片 4 枚，早落，不等大，卵形或狭卵形，长 2.5—3 毫米，内萼片披针形，先端渐尖，白色，长约 12 毫米，宽约 3 毫米；花瓣短距状，长约 2.5 毫米，远较内萼片短，近直立，棕色，向基部呈橙色；雄蕊明显伸出于花瓣，长约 3.5 毫米，花丝带黄色，长约 1.5 毫米，花药长约 2 毫米，黄色，瓣裂，药隔先端圆钝；雌蕊长约 4.5 毫米，花柱长约 2.5 毫米，柱头表面蜂窝状。果未见。花期 4 月。

产于湖北、四川。生于小山坡。海拔 860 米。模式标本为栽培品。本种系由 Roy Lancaster 于 1983 年 5 月采自湖北西北部武当山一个叫紫云庙后山坡的植株，Lancaster 1193 号，成功地种植于英国 Blackthorn Nursery 和 Royal Botanic Gardens, Stearn 根据他于 1992 年 4 月采自 Royal Bot. Gard. 的植株命名。

据 W. T. Stearn 记述，该种植物曾由 Mikinori Ogisu 引自四川江油（Jiangyou）。

33. 革叶淫羊藿（植物分类学报） 图版 65: 7—8

Epimedium reticulatum C. Y. Wu in Acta Phytotax. Sin. **25** (2): 156, 图 6, 1987.

多年生草本，植株高 30—40 厘米。根状茎紫红色，质坚硬，多须根。一回三出复叶基生和茎生，具 3 枚小叶；基生叶叶柄长约 20 厘米；茎生叶对生，叶柄长 5—6 厘米；小叶厚革质，光滑无毛，卵形，长 5—7 厘米，宽 3.5—5 厘米，先端急尖或渐尖，基部心形，两侧裂片近相等，圆形，边缘具多数刺齿，上面暗绿色，基出脉 5—7 条，稍凹陷，背面叶脉隆起，近脉腋处被疏柔毛，两面网脉显著；花茎具 2 枚对生叶或具 3—4 枚轮生。圆锥花序顶生，长约 30—35 厘米，具 40—45 朵花，序轴无毛，有时无总梗；花梗纤细，长约 1.5 厘米，被腺毛；花黄色，小；萼片 2 轮，外萼片长圆形，长