

长圆形或线形，单一，末回小羽片除主脉外，有分叉的侧脉，顶端有水囊，上面可见。叶干后纸质或坚纸质，褐绿色，两面无毛。孢子囊群生小脉顶部，初时为反卷的叶缘覆盖，成熟时撑开，布满叶的下面。

产陕西(太白山)、湖北西部、四川西北部(金川)和西部(康定)及云南西北部(怒江依江分水岭)。生石上，海拔2690—4600米。也分布于西伯利亚中部。模式标本采自湖北西部。

3. 高山珠蕨(台湾植物志) 布隆珠蕨(中国主要植物图说蕨类植物门) 图版29:12—15

Cryptogramma brunoniana (Wall. list. n. 396. 1828. nom. nud.) ex Hook. et Grev. Ic. Fil. t. 158. 1829; Presl, Tent. Pterid. 219. 1836; Diels in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 1 (4): 280. 1899; C. Chr. Ind. Fil. 187. 1906; 傅书遐, 中国主要植物图说 蕨类植物门 76. 1957; Shieh in H. L. Li et al., Fl. Taiwan I: 284. 1975; Y. L. Chang et al., Sporae Pterid. Sin. 162. f. 50 a—c. 1976; Ching et al. in C. Y. Wu, Fl. Xizang. 1: 76. t. 20, f. 1. 1983.—*Phorolobus brunonianus* Fée, Gen. Fil. 131. 1850—52. — *Cryptogramma crispa* var. *brunonianana* Bak. in Hook. et Bak. Syn. Fil. 144. 1874. — *Cryptogramma crispa* Bedd. Handb. Ferns Brit. Ind. 98. 1883, non R. Br. 1842. — *Cryptogramma crispa* f. *indica* Hook. Sp. Fil. 2: 129. 1858.

根状茎短而直立或斜升，先端被棕色膜质披针形鳞片。叶簇生，二型，不育叶较短，长3—4厘米，阔卵形或卵状三角形，三回细裂，羽片6—7对，基部一对最大，长1.6—2.2厘米，宽1.2—1.7厘米，卵形，二回细裂；小羽片上先出，末回裂片三角形或长圆形，尖头或急尖头，每裂片有小脉1条，顶端有纺锤形水囊，上面略下凹；能育叶的柄长12—16厘米，叶片长4—6厘米，宽2—3.5厘米，卵状长圆形或卵形，三回羽状；末回小羽片长3—5毫米，宽1.5—2毫米，初时线形，钝头或有小突尖。孢子囊群成熟时略宽或近长圆形，囊群盖褐色，质厚，成熟时略张开。

产云南西北部(德钦、茨中)、台湾东部及中部。日本、喜马拉雅山南坡也有分布。生石缝中，海拔3500—3700米。模式标本采自喜马拉雅(锡金)。

4. 陕西珠蕨(秦岭植物志) 图版29: 16—19

Cryptogramma shensiensis Ching in Fl. Tsinling. 2: 60. t. 15, f. 4—6. 1974.

植株高10—20厘米。根状茎短小，直立，先端连同叶柄基部略有淡棕色、膜质、披针形鳞片。叶丛生，二型，不育叶远较短，柄长4.5—6.5厘米，叶片长约3厘米，宽1—2厘米，长圆形，钝头，二至三回羽状；羽片4—5对，有柄，基部一对较大，长8—15毫米，宽6—10毫米，三角形或卵状三角形，二回羽状；小羽片上先出，照例基部一对最大，末回小羽片倒卵形，先端有2—3个粗齿或短锐尖，每齿有小脉1条，水囊线形，不达叶边。叶干后草



1—4.稀叶珠蕨 *Cryptogramma stelleri*: Prantl 1.植株全形, 2.能育羽片(放大), 3.孢子(放大), 4.叶轴中部横切面(放大)。5—11.珠蕨 *Cryptogramma raddeana* Fomin: 5.植株全形, 6.能育羽片的部分(放大), 7.不育羽片(放大), 8.根状茎上的鳞片(放大), 9—11.自叶柄基部至顶部的横切面(放大)。12—15.高山珠蕨 *Cryptogramma brunonianana* Wall. ex Hook. et Grev.: 12.植株全形, 13.能育羽片的部分(放大), 14.孢子(放大), 15.根状茎上的鳞片(放大)。16—19 陕西珠蕨 *Cryptogramma shensiensis* Ching: 16.植株全形, 17.能育羽片的部分(放大), 18.不育羽片的部分(放大), 19.根状茎上的鳞片。(张荣厚绘)