

6. 根状茎和叶柄基部的鳞片钻状线形, 棕色, 柔软; 第二对羽片上的小羽片有柄或具有狭翅的短柄。
.....7. 薄叶碎米蕨 *C. tenuifolia* Trev.

1. 脆叶碎米蕨(蕨类名词及名称) 图版 32: 14—17

Cheilosoria fragilis (Hook.) Ching et Shing, Glos. Terms & Names of Ferns 39. 1982. — *Cheilanthes fragilis* Hook. Fil. Exot. t. 96. 1859; Hook. et Bak. Syn. Fil. 135. 1874; Bedd. Ferns Brit. Ind. t. 223. 1867 et Handb. Ferns Brit. Ind. 91. 1883; C. Chr. Ind. Fil. 174. 1906.

植株高 15—30 厘米。根状茎直立, 先端被灰棕色钻状披针形鳞片。叶簇生, 柄长 5—6 厘米, 粗约 3 毫米, 栗黑色, 密被灰色或棕色腺毛及少数披针形鳞片; 叶片狭长披针形, 长 20—25 厘米, 中部宽 4—6 厘米, 先端渐尖, 向基部略变狭, 二回羽状; 羽片 15—20 对, 近平展; 中部羽片最大, 长 3—4 厘米, 中部宽约 1 厘米, 披针形, 钝尖头, 基部略变狭, 上侧平截, 与叶轴平行, 下侧斜出, 有极短柄, 一回羽状; 小羽片狭长圆形, 中部的较大, 长可达 7 毫米, 宽约 3 毫米, 先端圆钝, 基部与羽轴多少合生, 有狭翅相连, 边缘具不整齐的圆齿; 叶片顶部及下部羽片均略渐缩短。叶脉羽状, 侧脉二叉, 两面均可见。叶干后薄革质, 淡褐绿色, 两面疏生腺毛; 叶轴和叶柄同色, 下面圆, 上面顶部有沟, 中部以下平坦, 羽轴下面栗色, 圆形。上面灰绿色, 下凹, 均疏被淡棕色带状柔毛及灰色腺毛, 并有一小鳞片。孢子囊群生小脉顶端, 位于圆齿上; 囊群盖肾形或圆肾形边缘略具睫毛。

产云南南部(易武)和东南部(蒙自)。生石灰岩上, 海拔 1 000 米。也分布于缅甸(毛淡棉)及马来西亚。少见。模式标本采自缅甸(毛淡棉)。

2. 毛轴碎米蕨(中国高等植物图鉴) 舟山碎米蕨(中国主要植物图说 蕨类植物门)

图版 33: 1—6

Cheilosoria chusana (Hook.) Ching et Shing in Fl. Fujian. 1: 84. f. 77. 1982. — *Cheilanthes chusana* Hook. Sp. Fil. 2: 95. t. 106 B. 1852; Ching in Bull. Dept. Biol. Sun Yatsen Univ. No. 6. 26. 1933 et Ic. Fil. Sin. 3: t. 135. 1935; Tard.-Blot et C. Chr. in Fl. Indo-Chine 7 (2): 174. 1940; C. Chr. Ind. Fil. Suppl. 3: 54. 1934; DeVol, Ferns East Centr. China in Notes Bot. Chin. Mus. Heude No. 7. 113. 1945; Tagawa in Acta Phytotax. Geobot. 14: 93. 1951; 傅书遐, 中国主要植物图说 蕨类植物门 76. 图 93. 1957; Ohwi, Fl. Japan 44. 1965; I. c. et Nakaike, enlarged New Edit. 122. 1978; Ic. Corm. Sin. 1: 159. f. 318. 1972; Fl. Tsinling. 2: 71. 1974; Y. L. Chang et al., Sporae Pterid. Sin. 160. f. 49 et t. 31, f. 14, 17. 1976; 江苏植物志, 上册 30. 图 35. 1977; Edie, Ferns Hong Kong 253. 1978; Kurata et Nakaike, Ill. Pterid. Jap. 1: 106. 1979. — *Cheilanthes mysurensis* var. *chusana* Christ in Bull. Soc. Bot. Ital. 293. 1901 et Bull. Acad. Geogr. Bot. Mans 149. 1907; C. Chr. in Acta Hort. Gothob. 1: 91. 1924. — *Cheilanthes mysurensis* Hook. et

