

1. 三角羽旱蕨(蕨类名词及名称) 三角形旱蕨(中国蕨类植物孢子形态) 图版 35:
1—2

Pellaea calomelanos (Sw.) Link, Fil. Hort. Berol. 61. 1841; Hook. Sp. Fil. 2: 140. 1858; Hook. et Bak. Syn. Fil. 152. 1874; Clarke in Trans. Linn. Soc. 2. Bot. 1: 461. 1880; Bedd. Handb. Ferns Brit. Ind. 104. 1883; Christ, Farnkr. d. Erde 161. 1897; Tard. -Blot, Fl. Madag. 1: 163, t. 23, f. 5, 6. 1958; Valentine in Fl. Europaea 1: 10. 1964; Y. L. Chang et al. Sporae Pterid. Sin. 167, t. 32, f. 11—12. 1976. — *Pteris calomelanos* Sw. in Schrad. Journ. 2: 70. 1801; Bedd. Ferns Brit. Ind. t. 22. 1865. — *Pteris hastata* Thunb. Prod. Fl. Cap. 172. 1800, quoad, sp. non (Linn.) Thunb. — *Pellaea hastata* Prantl in Engl. Bot. Jahrb. 3: 418. 1882; Diels in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 1 (4): 267. 1899; C. Chr. Ind. Fil. 480. 1906.


植株高(7)15—25厘米。根状茎粗短横卧或斜升, 连同叶柄基部密被鳞片; 鳞片钻状披针形, 亮栗黑色, 有棕色狭边。叶簇生, 柄长(3)5—12厘米, 圆柱形, 亮栗黑色, 基部以上疏被棕色纤维状鳞片; 叶片长圆状三角形, 长(5)8—15厘米, 宽4—6厘米; 奇数一至二回羽状; 侧生羽片5—10对, 中部以下的奇数羽状(有小羽片3—5片)或单一, 斜向上, 柄长3—10毫米; 单羽片或小羽片卵状三角形(顶生小羽片戟形), 长6—10毫米, 宽5—8毫米, 钝头, 基部心形, 柄长约3毫米, 通常小羽片脱落而柄宿存。叶脉两面不显。叶干后革质, 灰绿色, 两面无毛; 叶轴、羽轴及小羽柄均为栗黑色, 下面疏被棕色短毛及腺体。孢子囊群沿小脉顶部一小段着生; 囊群盖由小脉顶端以外的叶边反折而成, 棕色, 全缘。

产云南北部(普渡河谷、金沙江河谷)、四川南部(米易)。生于旱河谷石缝, 海拔900—1800米。也分布于喜马拉雅西北部、埃塞俄比亚、安哥拉、好望角、马达加斯加。模式标本采自非洲。

2. 四川旱蕨(中国蕨类植物孢子形态) 图版 35: 12

Pellaea connectens C. Chr. in Acta Hort. Gothob. 1: 84, t. 18, f. d; t. 19, f. a. 1924 et Ind. Fil. Suppl. 3: 135. 1934; Y. L. Chang et al. Sporae Pterid. Sin. 169, f. 53, a, b et t. 32, f. 22—24. 1976.

植株高8—18厘米。根状茎短而直立, 连同叶柄基部密被鳞片; 鳞片钻状披针形, 薄而卷曲, 淡棕色。叶密集簇生; 柄长约3—8厘米。栗红色或褐栗色, 基部以上偶有一二棕色纤维状鳞片; 叶片披针形, 长5—10厘米, 宽2—4厘米, 短渐尖头, 基部不变狭, 奇数二回(有时三回)羽状; 侧生羽片6—10对, 斜展, 下部羽片长1—2厘米, 宽8—10毫米, 长圆三角形或长圆形, 柄长2—4毫米, 奇数一回(少有二回)羽状, 有侧生小羽片2—4对(基部小羽片有时三出); 中部以上的羽片略渐缩短; 末回小羽片或顶部单羽片长圆形或阔卵形, 长3—6毫米, 宽2—3毫米, 钝头, 基部圆截形或心形, 有明显的短柄, 不生孢子囊的幼叶全



1—2. 三角早蕨 *Pellaea calomelanos* Link: 1. 植株全形, 2. 根状茎上的鳞片(放大)。3—6. 旱蕨 *Pellaea nitidula* (Wall.) Bak.: 3. 植株全形, 4. 根状茎上的鳞片(放大), 5. 叶柄的一部分, 表示上面的密毛 $\times 10$, 6. 叶柄上的毛(放大)。7—8. 滇西旱蕨 *Pellaea mairei* Brause: 7. 植株全形, 8. 叶柄上的鳞片(放大)。9—11. 西南旱蕨 *Pellaea smithii* C. Chr.: 9. 植株全形, 10. 小羽片的一部分, 表示叶脉、孢子囊群的着生位置和囊群盖(放大), 11. 根状茎上的鳞片(放大), 12. 四川旱蕨 *Pellaea connectens* C. Chr., 植株全形。(张荣厚绘)