

轴下面疏被卷缩的、棘头状短腺毛。孢子囊群椭圆形或近圆形，每裂片3—5对，成熟后往往满布在整个裂片下面；囊群盖圆形，弯钩形或马蹄形，浅褐色，膜质，边缘啮蚀状或有睫毛，部分脱落。孢子周壁表面无褶皱，有颗粒状纹饰。

分布于甘肃（兴隆山）、湖北（巴东）、四川和云南。生林下，海拔2500—3200米。模式标本采自湖北（巴东）。

### 38. 斜羽蹄盖蕨（西北植物学报） 图版 36: 8—9


*Athyrium adscendens* Ching in Ching et Hsieh in Acta Bot. Bor. -Occ. Sin. **6** (2): 100. 1986.

根状茎直立，先端和叶柄基部密被深褐色、狭披针形的鳞片；叶簇生。能育叶长60—70厘米；叶柄长18—27厘米，基部直径约3毫米，黑褐色，向上褐禾秆色，光滑，略有光泽；叶片披针形，长36—40厘米，中部宽6—7厘米，先端短渐尖，基部略渐变狭，二回羽状；片20—25对，互生，斜展，无柄，基部2—3对略缩短，阔披针形，长3—5厘米，中部羽片披针形，向上弯弓，长5.5—6厘米，基部宽1.8厘米，先端渐尖，基部对称，截形，一回羽状；小羽片约16对，平展，基部一对略大，狭长圆形，长7—10毫米，基部宽约3毫米，钝头，并有2—3个短齿牙，基部近对称，下延在羽轴上成狭翅，彼此相连，向上的小羽片同形而逐渐缩小，但基部上侧略成耳状凸出。叶脉在下面明显，在小羽片上为羽状，侧脉5对，单一，有时下部的分叉。叶干后纸质，上面深褐色，下面浅褐色，两面无毛；叶轴褐禾秆色，上面被皱缩的棘头状短腺毛，羽轴下面褐色，光滑无毛。孢子囊群长圆形，在羽片顶部为弯钩形或马蹄形，生于小脉上侧，每小羽片4—6对，囊群盖同形，灰褐色，膜质，近全缘，边缘啮蚀状或有睫毛，宿存。孢子周壁表面无褶皱，有颗粒状纹饰。

特产于四川西部（峨眉山和大相岭）。生灌丛下或草甸中，海拔3000—3200米。模式标本采自峨眉山。

39. 希陶蹄盖蕨（西北植物学报） 腺叶蹄盖蕨、打箭炉蹄盖蕨、狭身蹄盖蕨（中国蕨类植物孢子形态）、松潘蹄盖蕨、永自蹄盖蕨、长圆蹄盖蕨、针羽蹄盖蕨、雷波蹄盖蕨、鳞柄蹄盖蕨（西北植物学报） 图版 37: 1—6, 7

*Athyrium dentigerum* (Wall. ex Clarke) Mehra et Bir in Amer. Fern Journ. **50**: 279. 1960. — *Asplenium filix-femina* (L.) Bernh. var. *dentigera* Wall. ex C. B. Clarke in Trans. Linn. Soc. Lond. II Bot. **1**: 491. 1880. — *Polypodium dentigerum* Wall., Num. List: no. 334. 1828, nom. nud. — *Athyrium filix-femina* (L.) Roth var. *dentigera* (Wall. ex Clarke) Bedd., Handb. Ferns Brit. India **169**. 1883. — *Asplenium filix-femina* (L.) Bernh. forma *dentigera* (Wall. ex Clarke) Hope in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. **14**(1): 125—126. 1902. — *Athyrium attenuatum* (Clarke) Tagawa forma *dentigerum* (Wall. ex Clarke) Khullar et Fraser-Jen. in Fraser-Jen. et Khullar in Bir, Aspects Pl. Sci. **6**: 99—



图版 36 1—2. 滇西蹄盖蕨 *Athyrium nudifrons* Ching: 1. 羽片; 2. 裂片 (放大)。3—4. 短羽蹄盖蕨 *Athyrium contingense* Ching et S. K. Wu: 3. 羽片; 4. 裂片 (放大)。5—7. 察陵蹄盖蕨 *Athyrium tarulaense* Ching: 5. 羽片; 6. 裂片 (放大); 7. 鳞片 (放大)。8—9. 斜羽蹄盖蕨 *Athyrium adscendens* Ching: 8. 羽片; 9. 裂片 (放大)。10—11. 疏羽蹄盖蕨 *Athyrium nephrodioides* (Bak.) Christ: 10. 羽片; 11. 裂片 (放大)。(冀朝棨绘)