

分布于福建(三明)、台湾、广西(上林大明山)及云南东南部至南部(罗平、广南、西畴、马关、金平、绿春、西双版纳)。生于常绿阔叶林下,海拔 800—1800 米。日本南部(九州)、越南北部、泰国北部、印度尼西亚也有。模式标本采自日本九州。

6. 角蕨(中国高等植物图鉴) 贞蕨(中国主要植物图说 蕨类植物门)

*Cornopteris decurrenti-alata* (Hook.) Nakai in Bot. Mag. Tokyo **44**:8. 1930; Ching in Sunyatsenia **5**:237. 1940; H. Ito, Fil. Jap. Ill. t.201. 1944; DeVol, Ferns East Centr. China **88**. 1945; 傅书遐, 中国主要植物图说 蕨类植物门 123, 图 165. 1957; Tagawa, Col. Ill. Jap. Pterid. **132**, t.54, f.294. 1959; Ic. Corm. Sin. **1**:186, f.371, 1972; Fl. Tsinling. **2**:110, t.28, f.1—4. 1973; DeVol et C. M. Kuo in H. L. Li et al., Fl. Taiwan **1**:454, pl. 161. 1975; Nakaike, Enum Pterid. Jap. **151**. 1975 et New Fl. Jap. Pterid. **324** cum f. 1982; 江苏植物志 上册:36, 图 43. 1976; M. Kato in Acta Phytotax. Géobot. **30**(4—6):106, f.3. 1979; 河南植物志 **1**:57, 图 73. 1981; Fl. Fujian. **1**:99, f. 91. 1982; 安徽植物志 **1**:100, 图 93. 1985; K. Iwats., Ferns & Fern Allies Jap. **242**, pl.161, f.3—4. 1992; Shing in J. F. Cheng et G. F. Zhu, Fl. Jiangxi **1**:141, f.123. 1993;—*Gymnogramma decurrenti-alata* Hook. Sp. Fil. **5**:142, t.294. 1864.—*Lep-togramma decurrenti-alata* (Hook.) J. Sm. in Journ. Bot. **232**. 1875.—*Nephrodium de-currenti-alatum* (Hook.) Diels in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. **1**(4):171. 1899.—*Dryopteris decurrenti-alata* (Hook.) C. Chr., Ind. Fil., **261**. 1906.—*Athyrium decur-renti-alatum* (Hook.) Copel. in Philip. Journ. Sci. Bot. **3**:297. 1909 et Gen. Fil. **150**. 1947.—*Diplazium decurrenti-alatum* (Hook.) C. Chr. in Bull. Acad. Géogr. Bot. Mans **70**. 1911 et Ind. Fil. Suppl. **1**:26. 1913; Tard.-Blot et C. Chr. in Lecomte, Fil. Indo-Chine **7**(2):260. 1940.—*Diplazium hookerianum* Koidz. in Bot. Mag. Tokyo **38**:105. 1924; Ogata, Ic. Fil. Jap. **2**:t. 66. 1929; C. Chr., Ind. Fil. Suppl. **3**:74. 1934.—*Diplazium opacum* sensu Tagawa in Acata Phytotax. Geobot. **8**:92. 1939, pro parte.—*Cornopteris tsangii* Ching in Bull. Fan Mem. Inst. Biol. New Ser. **1**:285. 1949.

6a. 角蕨(原变型) 图版 81: 1—8

form. *decurrenti-alata*

夏绿植物。根状茎细长横走或横卧,黑褐色,粗约 5 毫米,顶部被褐色披针形鳞片;叶近生。能育叶长可达 80 厘米;叶柄长达 40 厘米,暗禾秆色,基部被鳞片,向上近光滑,上面有纵沟两条;叶片卵状椭圆形,长达 40 厘米,阔达 28 厘米,羽裂渐尖的顶部以下一至二回羽状;侧生羽片达 10 对,斜展,彼此远离,披针形,渐尖头,基部近平截,近对称,下部的较大,椭圆披针形,长达 15 厘米,宽大 4 厘米,两侧羽状深裂,或为一回羽状;裂片或小羽片卵形或长椭圆形,长达 3 厘米,宽达 1 厘米,钝头,边缘浅裂,或有疏齿,或呈波状;叶脉可见,小脉单一或分叉,伸达叶边。叶草质,干