

长 1.1—1.3 厘米。花期夏季，果期秋季。

产于云南南部和东南部、海南南部。常生于较低海拔的密林中。分布于越南北部。

2. 藤枣属 *Eleutharrhena* Forman

Forman in Kew Bull. **30**: 98. 1975; 云南植物志 **3**: 226. 1983.

藤本。叶具羽状脉，叶柄在小枝的盘状体上着生，顶端膨大而膝曲，近于盾状着生。雄花序少花，簇生，腋生或生于叶脱落后的枝条上；雄花：萼片 12，排成 4 轮，覆瓦状排列，最内轮的最大；花瓣 6；雄蕊 6，分离，柱状，花药小，宽约与花丝相等，内向而横裂。雌花未见，但据果序判断显然有 6 心皮。果序梗粗壮，具 6 个放射状排列、带粗壮心皮柄的心皮；核果（一个心皮）基部收缩成柄状，花柱残迹远离基部；果核薄木质，胎座迹不明显；种子椭圆形，无胚乳，或有很薄的胚乳（？），子叶大而厚。

单种属，分布我国云南和印度阿萨姆。

1. 藤枣（云南植物志） 图版 2

Eleutharrhena macrocarpa (Diels) Forman in Kew Bull. **30**: 99. 1975; 云南植物志 **3**: 226, 图 64. 1983. — *Pycnarrhena macrocarpa* Diels in Engler, Pflanzenreich IV. **94**: 52. 1910; Forman in Kew Bull. **26**: 405. 1972.


木质藤本，嫩枝有直线纹，被微柔毛，稍老即脱落。叶革质，卵形至阔卵形，长圆状卵形或长圆状椭圆形，长 9.5—22 厘米，宽 4.5—13 厘米，先端渐尖或近骤尖，基部圆或钝，有时阔楔形，两面无毛，上面光亮；侧脉 5—9 对，两面凸起，下面更高，网状脉稀疏，不很明显；叶柄长 2.5—8 厘米。雄花序有花 1—3 朵，总梗长 6—10 毫米，被微柔毛；雄花：外轮萼片微小，近卵形，长不及 1 毫米，被微柔毛，中轮与外轮相似或稍长，内轮倒卵状楔形，长 1.5—1.7 毫米，最内轮大，近圆形或阔卵状近圆形，长约 2.5 毫米，无毛；花瓣 6，阔倒卵形，二侧边缘内卷，抱着花丝，无毛；雄蕊 6，长约 1.5 毫米。果序生无叶老枝上，总梗粗壮，长达 2 厘米，其上有 3—6 个核果；核果椭圆形，黄色或红色，长 2.5—3 厘米，宽 1.7—2.5 厘米，心皮柄长达 1.5 厘米；种子椭圆形，长 1.5—1.7 厘米，宽约 1 厘米。花期 5 月，果期 10 月。

产于云南南部和东南部。生于海拔 840—1 500 米的密林中，也见于疏林。印度阿萨姆也有。模式标本采自思茅。

3. 崖藤属 *Albertisia* Becc.

Becc. in Malesia **1**: 161. 1877; Forman in Kew Bull. **30**: 82. 1975. — *Epinetrum* Hiern, Catal. Welwitsch Afr. Pl. **1**: 21. 1896.

木质藤本，枝具凸起的盘状叶痕。叶柄两端明显肿胀，非盾状着生；叶纸质或革质，



图版 2 藤枣 *Eleutharrhena macrocarpa* (Diels) Forman; 1. 枝叶; 2. 雄花枝; 3. 雌花; 4—5. 外轮萼片; 6. 中轮萼片; 7. 内轮萼片; 8. 花瓣; 9. 雄蕊; 10. 果枝。(邓盈丰绘)