

凸尖，基部近截平至浅心形，有时近圆形或骤短尖，边缘具明显或不明显的波状圆齿；掌状脉常5条，最外侧的一对几不分枝，连同网脉两面均凸起；叶柄与叶片近等长或较长，在叶片的基部或紧靠基部着生。聚伞花序腋生，有花3至多朵，总梗直，长约2—4厘米；雄花：萼片椭圆形至阔卵圆形，长约2.5—3毫米，外轮宽约1.5毫米，内轮宽2—2.5毫米；花瓣卵状菱形，长1.5—2毫米，基部二侧反折呈耳状，抱着花丝；雄蕊长2—2.5毫米；雌花未见。核果红色，倒卵圆形，长8—10毫米，宽约7毫米。花期4—5月，果期7—9月。

产于湖北西部、四川东部和东南部、贵州北部、云南（产地不详）、广西北部、广东北部和东部、湖南西北部、江西各地、福建（永安）和浙江南部至东部。生于林缘或疏林中。模式标本采自宜昌附近南沱。

2. 苍白秤钩风（海南植物志） 电藤 图版6：6

Diploclisia glaucescens (Bl.) Diels in Engler, Pflanzenreich IV. **94**: 225. 1910; 海南植物志 **1**: 320, 图159. 1964; Forman in Kew Bull. **22**: 363. 1968; 云南植物志 **3**: 236, 图版66 (1—6). 1983; 广东植物志 **1**: 35, 图36. 1987. — *Cocculus glaucescens* Bl. Bijdr. 25. 1825. — *Diploclisia macrocarpa* (Wight) Miers in Ann. Mag. Nat. Hist. ser. 2, **7**: 42. 1851 et Contr. Bot. **3**: 280. 1871. — *Cocculus macrocarpa* Wight, Illustr. **1**: 22, t. 7. 1840; Benth. Fl. Hongkong. 12. 1861; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **23**: 28. 1886 — *Diploclisia kunstleri* (King) Diels, op. cit. 227. 1910. — *Cocculus kunstleri* King in Journ. As. Soc. Beng. **58**: 384. 1989.


木质大藤本；茎长可达20余米或更长，径达10余厘米；枝、叶和上种极相似，但只有1个腋芽。叶柄自基生至明显盾状着生，通常比叶片长很多，叶片厚革质，下面常有白霜。圆锥花序狭而长，常几个至多个簇生于老茎和老枝上，多少下垂，长约10—30厘米或更长；花淡黄色，微香，雄花：萼片长2—2.5毫米，外轮椭圆形，内轮阔椭圆形或阔椭圆状倒卵形，均有黑色网状斑纹；花瓣倒卵形或菱形，长1—1.5毫米，顶端短尖或凹头；雄蕊长约2毫米；雌花：萼片和花瓣与雄花的相似，但花瓣顶端明显2裂；退化雄蕊线形；心皮长1.5—2毫米。核果黄红色，长圆状狭倒卵圆形，下部微弯，长1.3—2（—3）厘米。花期4月，果期8月。

产于云南南部至东南部，广西西北部、西部至南部，广东东部、南部，海南各地。生于林中。广布亚洲各热带地区，南至伊里安岛。

根药用，据云可治毒蛇咬伤。

13. 木防己属 *Cocculus* DC. (nom. conserv.)

DC. Syst. **1**: 515. 1817; Miers, Contr. Bot. **3**: 253. 1871; Diels in Engler, Pflanzenreich IV. **94**: 227. 1910; Forman in Kew Bull. **15**:



图版 6 1—5. 秤钩风 *Diploclisia affinis* (Oliv.) Diels; 1. 叶; 2. 雄花; 3. 萼片; 4. 花瓣和雄蕊; 5. 果核。
 6. 苍白秤钩风 *Diploclisia glaucescens* (Bl.) Diels; 果核。7—13. 细圆藤 *Pericampylus glaucus* (Lam.)
 Merr.; 7. 叶; 8. 雄花; 9—10. 萼片; 11. 花瓣; 12. 雄蕊群; 13. 果核。14—24. 夜花藤 *Hypserpa nitida*
 Miers; 14—15. 叶; 16—20. 萼片; 21. 花瓣; 22. 雄蕊群; 23. 雄蕊; 24. 果核。(邓晶发绘)