

稍有棱角，无毛。叶薄革质，椭圆形、卵形或长椭圆形至披针状长椭圆形，较少倒披针形，长4—15厘米，宽1.5—5厘米左右，顶端渐尖，基部楔形或短尖，两面无毛，光亮；掌状脉3条，侧生的一对伸达叶片中部以上，连同网状小脉在两面稍凸起；叶柄长通常不超过1厘米。聚伞花序或聚伞圆锥花序，腋生，长1—5厘米，近无毛；雄花：萼片6，外轮近椭圆形，长0.8—1毫米，内轮卵状椭圆形至阔椭圆状近圆形，长约1.3毫米；花瓣6，深2裂的倒心形，基部不内折，很小，长约0.2—0.4毫米；雄蕊6，长约1毫米；雌花：萼片和花瓣与雄花的相似；退化雄蕊6，微小；心皮3，无毛。核果近圆球形，稍扁，长6—7毫米；果核骨质，背部有不规则的小横肋状皱纹。花期春、夏，果期秋季。

产于我国南部各省、区，北至湖南西南部、贵州南部和西藏吉隆。生于灌丛或疏林中。亚洲南部、东南部和东部也有分布。

14. 粉绿藤属 *Pachygone* Miers

Miers in Ann. Mag. Nat. Hist. ser. 2, 7: 43. 1851; Hook. f. et Thoms. Fl. Ind. 1: 203. 1855; Diels in Engler, Pflanzenreich IV.

94: 241. 1910; Forman in Kew Bull. 12: 447. 1958 et 22: 374. 1968.

木质藤本。叶通常卵形，掌状脉3—5条，叶柄非盾状着生。总状花序或狭窄的圆锥花序，腋生；雄花：萼片6—12，外面的微小，呈苞片状，里面的大，覆瓦状排列；花瓣6，较小，基部二侧反折呈耳状，抱着花丝；雄蕊6，分离，花药肥大，横裂；雌花：萼片和花瓣与雄花的相似；退化雄蕊6，比花瓣短；心皮3，一侧肿胀的卵形，无毛，花柱外弯。核果倒卵圆形或近球形，稍扁，花柱残迹移至近基部；果核骨质，肾状圆形，两侧稍凹，胎座迹小，近匙状；种子弯，无胚乳或有少量胚乳，缘倚子叶阔而厚，比胚根长很多。

本属模式种：*P. ovata* (Poir.) Hook. f. et Thoms.

约12种，分布在亚洲南部和东南部以及大洋洲。我国有3种。

分种检索表

1. 叶两面无毛。
 2. 雌花有6个不育雄蕊；雄花雄蕊比花瓣短；叶通常卵形 1. 粉绿藤 *P. sinica* Diels
 2. 雌花无不育雄蕊；雄花雄蕊比花瓣长；叶通常阔卵形 2. 肾子藤 *P. valida* Diels
 1. 叶两面被毛，下面很密 3. 滇粉绿藤 *P. yunnanensis* Lo
1. 粉绿藤 (中国种子植物科属辞典) 图版7: 9—14

Pachygone sinica Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin 11: 209. 1931; 广东植物志 1: 38, 图40. 1987.