

厘米，顶端常明显收缩，尾状渐尖至短渐尖，稍钝头，基部微凹，很少明显心形或微凸，干时常暗绿色；掌状脉向上的3条，平伸的2条，向下的常不可见，网状小脉两面微凸；叶柄通常比叶片短，细而直，顶端着生处距叶片基部约1—2毫米，呈不明显的盾状。雌、雄花序近同形，均为单伞形聚伞花序，疏散而少花，总梗丝状，长1.5—6.5厘米，末端簇生3—5个小聚伞花序；小苞片狭披针形，早落；花紫色，雄花：萼片6，外轮3片卵形，内轮3片近披针形，长1.2—1.4毫米，均尾尖；花瓣3，阔楔形，长约0.5毫米；雌花：萼片3，阔卵形，长1.5毫米，尾尖；花瓣3，扁圆形至阔楔形，长0.6毫米；柱头3裂。核果红色，阔倒卵状球形；果核长4.5—5毫米，宽约3毫米，背部有4行雕纹，靠中肋的2行点状，二侧的小横肋状，胎座迹不穿孔。花期11月。

产于云南漾濞、维西、嵩明、文山等地，广西隆林和四川米易。生于灌丛等处。模式标本采自云南漾濞。

#### 5. 四川千金藤 (植物分类学报) 图版 9: 7—9

**Stephani sutchuenensis** Lo in Acta Phytotax. Sin. **16**: 25, fig. 1 (7—9). 1978.

草质藤本，全株无毛。枝纤细，质稍硬，有直线纹。叶薄革质，三角形，通常长6—10厘米，宽5.5—9.5厘米，顶端有时钝，基部近截平；掌状脉向上的3条，向下的4—5条，在背面明显凸起，网脉稍明显；叶柄长4—7厘米，盾状着生于距叶片基部约1厘米处。单伞形聚伞花序腋生，稍肉质，雄花序梗与叶柄近等长，细而直，顶端无小苞片，小聚伞花序4—8个，簇生于花序梗的末端，每个小聚伞花序有花3—7朵。雄花：萼片6，排成2轮；卵圆形或卵形，顶端尾状渐尖，长1.7—2毫米，其中尾状部分长0.6—0.9毫米；花瓣3，稍肉质，贝壳状，长0.6—0.7毫米，宽1—1.2毫米；雄蕊柱与花瓣近等长；雌花萼片和花瓣均3片，形状大小均与雄花的相似。果序腋生，构造和雄花序相似，果序梗长8—9厘米；核果倒卵形，红色；果核长约7毫米，宽约3毫米，背部二侧各有7—8条小横肋，胎座迹穿孔。花期夏季。

产于四川峨眉山及邻近地区。生于林缘。

本种的花序、花和叶之质地都和雅丽千金藤相似，异点是后者的叶为长三角形，基部多少呈心形；胎座迹不穿孔；花和果比较小些。

据记载，四川乐山地区民间称本植物为小山豆根，其条状主根入药，味苦，功能清热解毒，止痛杀虫。

#### 6. 景东千金藤 (植物分类学报) 图版 9: 4—6

**Stephania chingtungensis** Lo in Acta Phytotax. Sin. **16**: 25, fig. 1 (4—6). 1978; 云南植物志 **3**: 243, 图版 70 (4—6), “sphalm. 图版 69 (4—6)”. 1983.

草质藤本，全株无毛；茎纤细，直径1.5—2毫米，有直线纹。叶纸质或薄纸质，阔三角形至扁圆状三角形，长5—11厘米，宽6—10厘米，顶端钝或渐尖，基部近截平，有时微圆或微凹，边缘有明显的波状粗齿，干时上面暗绿色，下面榄绿色；掌状脉10—11条，向上和平伸的粗大，向下的纤细，网脉明显；叶柄通常比叶片长，明显盾状着生。雄

花序生于腋生、细而稍肉质、通常无叶的短枝上，单伞形聚伞花序，总梗长 1.5—2.5 厘米，顶端有 3—4 个小聚伞花序，花梗纤细，长 1—2 毫米；雄花：萼片 6，内、外轮近同形，椭圆形，长约 2 毫米，顶端尾尖；花瓣 3，稍肉质，长约 1 毫米或不及；聚药雄蕊长约 1 毫米；雌花未见。果序生腋生、稍曲折、无叶或带小型叶的短枝上，为单伞形聚伞花序，总梗纤细，长 3—5 厘米；果梗长约 4 毫米；核果倒卵形；果核长约 7 毫米，宽约 5 毫米，背部二侧各有 1 列小横肋，每列约 6—7 条，胎座迹穿孔。

我国特有，产于云南西南部和南部。模式标本采自景东。

## 7. 台湾千金藤 (植物分类学报)

*Stephania sasakii* Hayata ex Yamamoto, Suppl. Ic. Pl. Formos. 4: 13. 1928; Yamamoto in Trans. Nat. Hist. Formos. 34: 20, 194. 1944; Li. Fl. Taiwan 2: 539. 1936; Lo in Acta Phytotax. Sin. 16: 30, fig. 3 (1—3). 1978.


木质藤本，长 3—5 米或过之；根粗壮，粗糙且有缢痕，径 1—2 厘米；枝有 10 纵槽，老枝褐色，径约 1 厘米，嫩枝绿色，径约 4 毫米。叶薄革质或厚纸质，阔卵形，长 9—10 厘米，宽 8.5—9 厘米，顶端短尖，基部通常圆，边缘稍反卷；掌状脉约 12 条，较粗大，下面高凸，网状小脉很明显；叶柄长 7—9 厘米或稍过之，两侧压扁，且有直线纹，于叶片近基部约 2 厘米处盾状着生。复伞形聚伞花序腋生或生于无叶老枝或老茎上，总梗长 6—12 厘米，伞梗约 8 条；苞片小，线形；雄花：萼片 6，很少 8，排成 2 轮，膜质，外面 3 片通常披针形或近长圆形，长 1.2—1.5 毫米，短尖，有缘毛，里面 3 片倒卵形，很少匙形，内凹，长约 2 毫米，顶端圆，基部爪状，边缘有锯齿；花瓣 3，极少 4，淡黄色或白色，阔卵形或近圆形，深内凹，里面有疣状突起；聚药雄蕊有 6 个花药。核果具长 2—3 毫米的梗，成熟时红色，阔倒卵形至近圆形，两侧压扁；果核长 10—12 毫米，背部有柱状雕纹 4 行，柱状体的顶端常头状且微弯。花期春夏间。

我国特有，产于台湾兰屿。

## 8. 一文钱 (云南思茅) 小寒药 (四川)

*Stephania delavayi* Diels in Engler, Pflanzenreich IV. 94: 275. 1910, excl. descr. fr.; Lo in Acta Phytotax. Sin. 16: 26, fig. 3 (4—6). 1978; 云南植物志 3: 245. 图版 18 (4—6). 1983. — *S. graciliflora* Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agr. 12: 243. 1940; Lien in Acta Phytotax. Sin. 13: 45, 47, fig. 6. 1975.

纤细草质藤本，长约 1—2 米；茎、枝细瘦，有条纹，均无毛。叶薄纸质，三角状近圆形，长通常 3—5 厘米，有时可达 7 厘米。宽与长近相等或稍过之，顶端钝圆，常有小凸尖，基部近截平，二侧圆，两面无毛；下面粉绿色；掌状脉约 9—10 条，纤细，连同很密的网状小脉均在下面微凸起，干时褐色，明显可见；叶柄通常与叶片近等长，在叶片上明显盾状着生。复伞形聚伞花序腋生或生于腋生、具小型叶的短枝上，总梗长约 1—3.5 厘米或过之，伞梗 3—7，长约 0.3—1.2 厘米，均纤细；花梗纤细，长不及 0.5 毫米；雄花：萼片 6 (很少 8)，排成 2 轮，倒卵状楔形或阔倒卵状楔形，较少倒卵圆形，长 1—



图版 9 1—3. 草质千金藤 *Stephania herbacea* Gagnep. : 1. 叶片; 2—3. 果核。4—6. 景东千金藤 *Stephania chingtungensis* Lo. : 4. 叶片; 5—6. 果核。7—9. 四川千金藤 *Stephania sutchuenensis* Lo. : 7. 叶片; 8—9. 果核。10—12. 西南千金藤 *Stephania subpeltata* Lo. : 10. 叶片; 11—12. 果核。(余汉平绘)