

18. 锡生藤属 *Cissampelos* Linn.

Linn. Sp. Pl. 1031. 1753; Miers, Contr. Bot. **3**: 127. 1871; Diels in Engler, Pflanzenreich IV. **94**: 283. 1910; Forman in Kew Bull. **22**: 355. 1968.

藤本或直立灌木。叶柄盾状或非盾状着生，叶片卵形、心形或近圆形，具掌状脉。雄花序腋生，为具总梗的伞房状聚伞花序，有时生于特化小枝上，花序自退化成苞片状的叶腋中生出；雄花：萼片4，背部常被毛，倒卵形，开放时向外伸展；花瓣合生成碟状或杯状，很少2—4裂几达基部；聚药雄蕊盾状，有时4（—10）花药；雌花序为延长的聚伞圆锥花序，由密伞花序组成，苞片通常增大为叶状，彼此重叠；雌花：萼片1，花瓣1（罕2或3），与萼片对生；心皮1，常被毛。核果近球形，稍扁，常被毛；果核脆壳质或近骨质，背部中脊二侧有圆锥状或小横肋状雕纹，胎座迹通常近球形；种子马蹄形，胚长而柱状，藏于胚乳中，子叶扁平，与胚根近等长或较短。

本属模式种：锡生藤 *C. pareira* Linn.

约20—25种，分布于全世界热带地区，以非洲和美洲为多，亚洲很少，我国仅下述1变种。

1. 锡生藤

Cissampelos pareira Linn. Sp. Pl. 1031. 1753.

1a. var. *pareira*

分布美洲热带和非洲热带。

我国不产。

1b. 锡生藤（中国种子植物科属辞典）（变种） 亚呼鲁（云南傣语） 图版15: 1—

6

var. *hirsuta* (Buch. ex DC.) Forman in Kew Bull. **22**: 356. 1968 et in Fl. Malesiana ser. 1, **10** (2): 236, fig. 17, 1986; 云南植物志 **3**: 256, 图版71 (1—6). 1983; 西藏植物志 **2**: 158, 图45 (5—6). 1985. — *C. hirsuta* Buch. ex DC. Syst. Veg. **1**: 535. 1818 et Prodr. **1**: 101. 1824.

木质藤本；枝细瘦，有条纹，通常密被柔毛，很少近无毛。叶纸质，心状近圆形或近圆形，长宽均约2—5（—12）厘米，顶端常微缺，具凸尖，基部常心形，有时近截平，很少微圆，两面被毛，上面常稀疏，下面很密；掌状脉5—7条，在下面稍凸；叶柄常密被柔毛，比叶片短。雄花序为腋生、伞房状聚伞花序，单生或几个簇生，花序轴和分枝均细瘦，密被柔毛；雄花：萼片长1.2—1.5毫米，背面被疏而长的毛；花冠碟状；聚药雄蕊长约0.7毫米；雌花序为狭长的聚伞圆锥花序，长达18厘米，通常不超过10厘米，叶状苞片近圆形，在花序轴上彼此重叠，密被毛；雌花：萼片阔倒卵形，长约1.5毫米；