

紫色，直径3—4毫米，无毛。叶纸质，宽倒披针形，倒披针状椭圆形，长10—15厘米，宽3.5—5厘米，先端渐尖或骤狭尾状尖，基部阔楔形或圆，上面无毛，下面幼嫩时叶脉及脉腋有白色弯曲长毛；侧脉每边10—13条；叶柄长8—13毫米，初被白色长毛，托叶痕为叶柄长的 $\frac{1}{5}$ — $\frac{1}{2}$ 。花蕾卵圆形，长2.5—3厘米，密被长绢毛；花梗径3—4毫米，密被白色平伏长柔毛。花先叶开放，红色或淡红色，芳香，直径约6厘米；佛焰苞状苞片紧接花被片；花被片9，倒披针形或匙形，长5—5.6厘米；雄蕊长9—10毫米，药隔伸出长0.5—0.7毫米短尖头，花药长4.5—5毫米，侧向开裂，花丝长3.5—4毫米，紫红色。雌蕊群圆柱形，长2厘米，径2毫米，柱头长1毫米。聚合果圆柱形，长4—10厘米，常由于部分心皮不育而弯曲；果梗长约1厘米，残留有长柔毛；蓇葖扁圆球形，顶端钝圆，有尖凸起小瘤状点，背面全分裂为二果片，宽约10毫米，高6—7毫米；种子去外种皮，心形，宽约8—9毫米，高约5—6毫米，花期4—5月，果期9—10月。

产于浙江（天目山、龙泉、遂昌）。生于海拔700—1000米的林中。模式标本采自天目山。

25. 楠薔玉兰（新拟）

Magnolia elliptigemmata C. L. Guo et L. L. Huang in Journ. Wuhan. Bot. Res.

落叶乔木，高10数米，胸40—50厘米，树皮灰色，有灰白块状皮孔；小枝、叶柄及叶面无毛。叶纸质，倒卵形或宽倒卵形，长5—9厘米，宽4.5—6.5厘米，先端宽圆或微凹缺，有短急尖，基部楔形或宽楔形，上面深绿色，下面绿色，幼嫩时被白色平伏短柔毛，侧脉每边7—8条；叶柄长1.5—2厘米；托叶痕为叶柄长的 $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ 。花蕾椭圆形，被白色平伏短柔毛；花先叶开放，芳香，花被11（12），淡紫红色，上部色较淡，基部色较深，近相似，倒卵状匙形，长5.5—6.7厘米，宽2.2—3.2厘米；花梗长约6毫米；雄蕊约50枚，长1—1.5厘米，花药侧向开裂，花丝长约4毫米。药隔伸出长约1毫米的短尖；雌蕊群圆柱形，长1.8—2厘米，无毛，花柱长2—3毫米。聚合果长4—7厘米，常部分心皮不育而扭曲；蓇葖扁圆球形，径0.7—1.5厘米，两瓣开裂，具点状瘤状突起；种子豆形或心形，外种皮红色，内种皮浅褐色。花期3月，果期9—10月。

产于湖北远安。生于海拔700米的林地。模式标本采自远安。

组6. 望春玉兰组 Sect. *Buergeria* (Sieb. et Zucc.) Dandy in Camellias and Magnolias Rep. Conf. 73. 1950. — *Buergeria* Sieb. et Zucc. in Abh. Bayr. Akad. Wiss. Math. Phys. 4, 2: 186. 1846.

落叶乔木或灌木；先开花后出叶，外轮花被片远比内数轮小，呈萼片状，瓣状花被片红色或紫色。

本组模式种：*M. tomentosa* Thunb. [*M. stellata* (Sieb. et Zucc.) Maxim.]

26. 望春玉兰（秦岭植物志） 图版34：1—10