

叶柄比较短，花被片外轮较小，通常2轮，很少3—4轮，6片，很少12—17片。

本组模式种：*M. figo* (Lour.) Spreng.

本组我国有4种。

9. 云南含笑 (中国树木志) 皮袋香 (中国高等植物图鉴) 图版42: 1—7

Michelia yunnanensis Franch. ex Finet et Gagnep. in Mém. Soc. Bot. France 4: 43. pl. 6. 1905; 中国高等植物图鉴 1: 796. 图 1591. 1972; 中国树木志 1: 487. 1983. —
M. dandyi Hu in Bull. Fan Mém. Inst. Biol. Bot. Ser. 8: 34. 1937.

灌木，枝叶茂密，高可达4米；芽、嫩枝、嫩叶上面及叶柄、花梗密被深红色平伏毛。叶革质、倒卵形，狭倒卵形、狭倒卵状椭圆形，长4—10厘米，宽1.5—3.5厘米，先端圆钝或短急尖，基部楔形，上面深绿色，有光泽，下面常残留平伏毛；侧脉每边7—9条，干时网脉两面凸起；叶柄长4—5毫米，托叶痕为叶柄长的2/3或达顶端。花梗粗短，长3—7毫米，有1苞片脱落痕；花白色，极芳香，花被片6—12(17)片，倒卵形，倒卵状椭圆形，长3—3.5厘米，宽1—1.5厘米，内轮的狭小，雄蕊长0.5—1厘米，花药长5—7毫米，侧向开裂，花丝白色，长3毫米，药隔伸出成1—3毫米的短尖头，雌蕊群及雌蕊群柄均被红褐色平伏细毛，雌蕊群卵圆形或长圆状卵圆形，长10—13毫米，心皮8—20，卵圆形，长3—4毫米，花柱长约1毫米，花柱具纵沟；胚珠5—6枚。聚合果通常仅5—9个蓇葖发育，蓇葖扁球形，宽5—8毫米，顶端具短尖，残留有毛；种子1—2粒。花期3—4月，果期8—9月。


产于云南中部、南部。生于海拔1100—2300米的山地灌丛中。模式标本采自蒙自。

花极芳香，可提取浸膏，为优良的观赏植物；叶有香气，可磨粉作香面。近年我们从昆明引种到广州。

10. 紫花含笑 (中国树木志) 图版42: 8—10

Michelia crassipes Law in Bull. Bot. Res. 5(3): 121. 1985; 中国树木志 1: 488. 1983; 广东植物志 1: 14. 图 11. 1987.

小乔木或灌木，高2—5米，树皮灰褐色；芽、嫩枝、叶柄、花梗均密被红褐色或黄褐色长绒毛。叶革质，狭长圆形、倒卵形或狭倒卵形，很少狭椭圆形，长7—13厘米，宽2.5—4厘米，先端长尾状渐尖或急尖，基部楔形或阔楔形，上面深绿色，有光泽，无毛，下面淡绿色，脉上被长柔毛；叶柄长2—4毫米；托叶痕达叶柄顶端。花梗长3—4毫米，花极芳香；紫红色或深紫色，花被片6，长椭圆形，长18—20毫米，宽6—8毫米，雄蕊长约1厘米，花药长约6毫米，药隔伸出短急尖；雌蕊群长约8毫米，不超出雄蕊群，密被柔毛，雌蕊群柄长约2毫米，果时长3—4毫米，粗3—4毫米；心皮卵圆形，长3.5—4毫米，密被柔毛；花柱长2毫米。聚合果长2.5—5厘米，具蓇葖10枚以上；蓇葖扁卵圆形或扁圆球形，有乳头状突起和残留有毛，果梗粗短，长1—2厘米，粗3—5毫米。花期4—5月，果期8—9月。



图版 42 1—7. 云南含笑 *Michelia yunnanensis* Franch. ex Finet et Gagnep. : 1. 花枝; 2. 叶上面和下面;
3—4. 外轮及内轮花被片; 5. 花去花被片示雄蕊群和雌蕊群; 6. 雄蕊; 7. 聚合果。8—10. 紫花含笑
Michelia crassipes Law: 8. 叶; 9. 花; 10 聚合果。(邓盈丰绘)