

短；花梗长 3—20 毫米，具数枚小苞片。雌花：雌蕊群近球形，径 6—8 毫米，具雌蕊 30—55 枚，子房长圆状倒卵圆形，花柱顶端具盾状的柱头冠；花梗 3—30 毫米。聚合果近球形，直径 2.5—4 厘米；成熟心皮倒卵圆形，长 10—22 毫米；干时革质而不显出种子；种子 2—3 粒，少有 4—5 粒，长圆状肾形，长 5—6 毫米，宽 3—5 毫米。花期 5—8 月，果期 8—12 月。

产于湖北、广东、海南、广西、贵州、云南。生于海拔 400—900 米的山谷、溪边、密林中。锡金、孟加拉、越南、老挝、缅甸、泰国、印度、斯里兰卡等也有分布。

藤及根称鸡血藤，药用，行气止痛，祛风除湿，治风湿骨痛、跌打损伤。

6. 南五味子（本草纲目） 图版 68：9—15

Kadsura longipedunculata Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France **52**: Mém. **4**: 53. Pl. 8, B, 8—15. 1905 sphalin. longepedunculata; A. C. Smith in Sargentia **7**: 183. 1947; 湖北植物志 **1**: 435. 1976; 中国树木志 **1**: 528. 1983; 广东植物志 **1**: 23. 图 23. 1987. — *K. peltigera* Rehd. et Wils. in Sargent, Pl. Wils. **1**: 410. 1913; Hand. -Mazz. Symb. Sin. **7**: 245. 1931; Fang, Icon. Pl. Omei. **2** (2): pl. 74. 1944.

藤本，各部无毛。叶长圆状披针形、倒卵状披针形或卵状长圆形，长 5—13 厘米，宽 2—6 厘米，先端渐尖或尖，基部狭楔形或宽楔形，边有疏齿，侧脉每边 5—7 条；上面具淡褐色透明腺点，叶柄长 0.6—2.5 厘米。花单生于叶腋，雌雄异株；雄花：花被片白色或淡黄色，8—17 片，中轮最大 1 片，椭圆形，长 8—13 毫米，宽 4—10 毫米；花托椭圆形，顶端伸长圆柱状，不凸出雄蕊群外；雄蕊群球形，直径 8—9 毫米，具雄蕊 30—70 枚；雄蕊长 1—2 毫米，药隔与花丝连成扁四方形，药隔顶端横长圆形，药室几与雄蕊等长，花丝极短。花梗长 0.7—4.5 厘米；雌花：花被片与雄花相似，雌蕊群椭圆形或球形，直径约 10 毫米，具雌蕊 40—60 枚；子房宽卵圆形，花柱具盾状心形的柱头冠，胚珠 3—5 叠生于腹缝线上。花梗长 3—13 厘米。聚合果球形，径 1.5—3.5 厘米；小浆果倒卵圆形，长 8—14 毫米，外果皮薄革质，干时显出种子。种子 2—3，稀 4—5，肾形或肾状椭圆形，长 4—6 毫米，宽 3—5 毫米。花期 6—9 月，果期 9—12 月。


产于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、云南。生于海拔 1 000 米以下的山坡、林中。模式标本采自四川城口。

根、茎、叶、种子均可入药；种子为滋补强壮剂和镇咳药，治神经衰弱、支气管炎等症；茎、叶、果实可提取芳香油；茎皮可作绳索。

7. 多子南五味子（新拟） 图版 69：7—10

Kadsura polysperma Yang in Contr. Boil. Lab. Sci. Soc. China **12**: 104. f. 5. 1939; A. C. Smith in Sargentia **7**: 192. 1947.

藤本，各部无毛；顶芽卵圆形，外芽鳞圆形、宽卵形，具中肋和缘毛，当年生枝淡黄褐色，老枝紫褐色。叶纸质，卵形，卵状椭圆形、狭椭圆形或长圆状椭圆形，长 6—12 厘米，宽 2.5—5.5 厘米，先端骤狭尾状尖或渐尖，基部楔形或狭楔形，全缘或上半部具



图版 68 1—8. 异形南五味子 *Kadsura heteroclita* (Roxb.) Craib. 1. 枝; 2. 花; 3—6. 花被片; 7. 雄蕊群; 8. 雄蕊群纵切面。9—15. 南五味子 *Kadsura longipedunculata* Finet et Gagnep. 9. 果枝; 10. 雄花; 11. 雄蕊群; 12. 雄蕊群纵切面; 13. 雄蕊; 14. 雌蕊群; 15. 雌蕊 (邓盈丰绘)。