

显的腺点，种子较大等可以识别。

3. 中华五味子亚属 Subgen. *Sinoschisandra* Law in Addenda. — *Schisandra* Sect. *Pleiotema* A. C. Smith in Sargentia 7: 93. 1947. p. p.

雄花：花托顶端伸长，形成不规则头状或盾状的附属体，雄蕊 8—55，螺旋状排列成球形或扁球形的雄蕊群，花药内侧向或侧向开裂，两药室宽，分隔在两侧，常基部靠近，顶端分开；药隔通常凸出，下部雄蕊具明显花丝，上部雄蕊常与盾状附属物合生则无花丝。

本亚属模式种：S. *henryi* Clarke

#### 6. 翼梗五味子（中国高等植物图鉴）

*Schisandra henryi* Clarke. in Gard. Chron. III. 38: 162. f. 55. 1905. Rehd. et Wils. in Sargent, Pl. Wils. 1: 413. 1913; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 10: 191. 1929; 陈嵘, 中国树木分类学 306. 图 230. 1937; Fang, Icon. Pl. Omei. 1 (2): pl. 70. 1944; A. C. Smith in Sargentia 7: 114. f. 19. 1947; 中国高等植物图鉴 1: 802. 图 1604; 1972; 湖北植物志 1: 437. 图 616. 1976. 中国树木志 1: 531. 1983. — *S. elongata* var. *longissima* Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 38: 354. 1908. p. p. — *S. hypoglaucula* Lévl. in Fedde Repert. Sp. Nov. 9: 459. 1911. et Fl. Kouy-Tchéou 270. 1914. et Cat. Yun-Nan 175. 1916. — *Schisandra henryi* Clarke var. *marginalis* A. C. Smith in Sargentia 7: 115. f. 19. 1947. syn. nov.

#### 6a. 翼梗五味子（原变种） 图版 73: 1—13

##### var. *henryi*

落叶木质藤本，当年生枝淡绿色，小枝紫褐色，具宽近 1—2.5 毫米的翅棱，被白粉；内芽鳞紫红色，长圆形或椭圆形，长 8—15 毫米，宿存于新枝基部。叶宽卵形、长圆状卵形，或近圆形，长 6—11 厘米，宽 3—8 厘米，先端短渐尖或短急尖，基部阔楔形或近圆形，上部边缘具胛脉齿尖的浅锯齿或全缘，上面绿色，下面淡绿色，侧脉每边 4—6 条，侧脉和网脉在两面稍凸起；叶柄红色，长 2.5—5 厘米，具叶基下延的薄翅。雄花：花柄长 4—6 厘米，花被片黄色，8—10 片，近圆形，最大一片直径 9—12 毫米，最外与最内的 1—2 片稍较小，雄蕊群倒卵圆形，直径约 5 毫米；花托圆柱形，顶端具近圆形的盾状附属物；雄蕊 30—40 枚，花药长 1—2.5 毫米，内侧向开裂，药隔倒卵形或椭圆形，具凹入的腺点，顶端平或圆，稍长于花药，近基部雄蕊的花丝长 1—2 毫米，贴生于盾状附属的雄蕊无花丝；雌花：花梗长 7—8 厘米，花被片与雄花的相似；雌蕊群长圆状卵圆形，长约 7 毫米，具雌蕊约 50 枚，子房狭椭圆形，花柱长 0.3—0.5 毫米。小浆果红色，球形，直径 4—5 毫米，具长约 1 毫米的果柄，顶端的花柱附属物白色，种子褐黄色，扁球形，或扁长圆形，长 3—5 毫米，宽 2—4 毫米，高 2—2.5 毫米，种皮淡褐色，具乳头状凸起或皱凸起，以背面极明显，种脐斜 V 形，长为宽的 1/4—1/3。花期 5—7 月，果