

期 8—9 月。

产于浙江、江西、福建、河南南部（信阳）、湖北、湖南、广东、广西、四川中部、贵州、云南东南部。生于海拔 500—1 500 米的沟谷边、山坡林下或灌丛中。模式标本采自云南红河州。

茎供药用，有通经活血、强筋壮骨之效。

6b. 滇五味子（变种） 图版 73：13—29

var. *yunnanensis* A. C. Smith in *Sargentia* 7: 116. 1947.

与原变种区别在于叶背无白粉，两面近同色；小枝的棱翅狭而粗厚，不为薄翅状；最外面的雄蕊几无花丝；种皮明显皱纹近似瘤状凸起。花期 5—7 月，果期 7 月下旬至 9 月。

产于云南南部至东南部、西藏东南部。生于海拔 1 000—2 500 米的沟谷、山坡林中或丛林中。模式标本采自云南思茅。

7. 毛叶五味子（峨眉植物图志）

*Schisandra pubescens* Hemsl. et Wils. in *Kew Bull. Misc. Inf.* 150. 1906; *Hand. - Mazz. Symb. Sin.* 7: 244. 1931; *Fang Icon Pl. Omei.* 1 (2): Pl. 72. 1944. *Rehd. et Wils. in Sargent, Pl. Wils.* 1: 413. 1913; A. C. Smith in *Sargentia* 7: 118. 1947. — *S. vestita* Pax et K. Hoffm. in *Fedde Repert. Sp. Nov.* 12: 381. 1922.

7a. 毛叶五味子（原变种） 图版 74：9—19

var. *pubescens*

落叶木质藤本，芽鳞、幼枝、叶背、叶柄被褐色短柔毛，当年生枝淡绿色，基部常宿存宽三角状半圆形、宽约 2.5 毫米的芽鳞，小枝紫褐色，具数纵皱纹；叶纸质，卵形、宽卵形或近圆形，长 8—11 厘米，宽 5—9 厘米，先端短急尖，基部宽圆或宽楔形，上部边缘具稀疏胫质尖的浅钝齿，具缘毛，中脉凹入延至叶柄上面，侧脉每边 4—6 条，侧脉和网脉两面凸起。雄花的花梗长 2—3 厘米，被淡褐色微毛，花被片淡黄色，6 或 8 片，外轮 3 片稍坚厚，外具微毛和缘毛，最外轮的椭圆形，长 4—6 毫米，中轮的近圆形，直径 7—10 毫米，最内面的近倒卵形，长 7—8 毫米；雄蕊群扁球形，高 5—7 毫米，花托圆柱形，长约 4 毫米，顶端圆钝，无盾状附属物；雄蕊 11—24 枚，雄蕊长 3—4 毫米，花药长约 2 毫米，两药室分离，内向，花丝长 0.5—1 毫米，近上部的雄蕊贴生于花托顶端，几无花丝，药隔伸长 0.5—1 毫米，具透明小腺点，最内层雄蕊退化变小；雌花：花梗长 4—6 毫米，花被片与雄花的相似，雌蕊群近球形或卵状球形，长 5—7.5 毫米，心皮 45—55，卵状椭圆形，长约 2 毫米，花柱长 0.2—0.4 毫米，柱头呈蚀齿状短缘毛，末端尖。聚合果柄长 5.5—6 厘米，聚合果长 6—10 厘米，聚合果柄、果托、果皮及小浆果柄，被淡褐色微毛；成熟小浆果球形、橘红色；种子长圆形体形，长 3—3.7 毫米，宽约 3 毫米，高 2—2.5 毫米，暗红褐色；种脐宽 V 形；稍凸出，长为宽的 1/4。花期 5—6 月，果期 7—9 月。