

式标本采自四川宝兴。

16. 小花五味子 (中草药通讯) 图版 76: 1—9

*Schisandra micrantha* A. C. Smith in *Sargentia* 7: 135. 1947; 中草药通讯 (8) 3: 37. 1977; 中草药 (13) 1: 40, 42. 1982.

落叶细弱木质藤本, 全株无毛。小枝纤细, 一年生枝紫色或灰色, 叶柄基部下延成细纵条纹。叶薄纸质, 卵形或椭圆状卵形, 长 3—8 厘米, 宽 2—4 厘米, 先端渐尖, 基部阔楔形或圆, 下延至叶柄成极狭翅, 2/3 以上边缘具疏浅锯齿, 齿尖胼胝质, 上面绿色, 中脉及侧脉稍凸起, 下面灰绿色; 侧脉每边 3—5 条; 叶柄长 5—20 毫米, 上面具狭纵沟。花黄色, 单生于当年生小枝的叶腋或苞片腋间; 雄花花柄长 1.5—3 厘米, 花被片 7—8 片, 肉质, 近相似, 圆形或宽椭圆形, 最大的一片长 4—6 毫米, 最里面 2 片倒卵形, 长 3—4 毫米。雄花: 雄蕊群卵圆形, 长 3—4 毫米, 花托卵状圆柱形, 顶端伸长, 具圆形盾状附属物; 雄蕊 8—12 枚, 排成 2—3 轮, 集中在花托顶端, 花药内侧向开裂, 长 0.5—1 毫米, 药隔倒卵形, 长 0.7—1 毫米, 顶端宽平, 与药室近等长, 具不明显的腺体; 雌花: 花梗和花被片与雄花的相似, 雌蕊群近球形, 直径 2.5—4 毫米, 雌蕊 16—35 枚, 子房狭卵圆形, 长 1.2—2 毫米, 花柱长 0.3—0.6 毫米。聚合果柄长 2—5 厘米, 聚合果轴长 1.5—4 厘米, 小浆果椭圆状长圆体形, 长 6—8 毫米, 外果皮具不明显腺体, 种子扁椭圆体形, 长 3.3—4 毫米, 种皮具明显皱纹。花期 5—7 月, 果期 8—9 月。

产于广西、贵州、云南中部及东南部。生于海拔 1 000—3 000 米的山谷、溪边、林间。模式标本采自云南屏边。

4. 团蕊五味子亚属 Subgen. *Sphaerostema* (Bl.) Law in Addenda. — *Schisandra* Sect. *Sphaerostema* (Bl.) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 20: 101. 1933; A. C. Smith in *Sargentia* 7: 95. 1947. — *Sphaerostema* Bl. Bijdr. Fl. Ned. Ind. 22: excl. *Schisandra plena* A. C. Smith.

雄花: 花托膨大, 肉质, 近球形, 雄蕊 12—16 枚, 形成与花托同形、同大的雄蕊群, 两药室近平行, 分隔在药隔两侧, 内向或侧向开裂, 具短花丝, 每雄蕊钳入花托凹穴中。

本亚属模式种: *S. axillaris* (Bl.) Hook. f. et Thoms.

17. 合蕊五味子 (经济植物手册) 满山香

*Schisandra propinqua* (Wall.) Baill. Hist. Pl. 1: 148. f. 183. 184. 1868; Hook. f. et Thoms. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 45. 1872; A. C. Smith in *Sargentia* 7: 149. 1947. 中国树木志 I: 538. 1983. — *Kadsura propinqua* Wall. Tent. Fl. Nepal. 2: t. 15. 1824. — *Schisandra propinqua* (Wall.) Baill. var. *intermedia* A. C. Smith in *Sargentia* 7: 152. f. 28. 1947. syn. nov.

17a. 合蕊五味子 (原变种)

var. *propinqua*