

- 1.5—3.8 厘米。
10. 叶长倒卵形；侧脉在叶面凹陷；花直径 2.5—3.8 厘米
..... 6. 紫玉盘 *U. microcarpa* Champ. ex Benth.
10. 叶椭圆状长圆形或卵状长圆形；侧脉在叶面扁平；花直径 1.5 厘米
..... 8. 小花紫玉盘 *U. rufa* Bl.
9. 果长圆筒状，长 5—6 厘米，直径 2—2.5 厘米；花大，直径达 9 厘米
..... 9. 山椒子 *U. grandiflora* Roxb.

1. 光叶紫玉盘(海南植物志) 挪藤(江西) 图版 5

Uvaria boniana Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Francé 53, Mém. 4: 71, Pl. 11a. 1906, et in Lec. Fl. Gén. Indo-Chine 1: 55, Pl. 6A. 1907; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 7: 304. 1929; 蒋英, 中国植物学杂志 2 (3): 679. 1935; 陈焕镛、侯宽昭, 植物分类学报 7: 2. 1953; 蒋英、李秉滔, 海南植物志 1: 237. 1964.

攀援灌木, 除花外全株无毛。叶纸质, 长圆形至长圆状卵圆形, 长 4—15 厘米, 宽 1.8—5.5 厘米, 顶端渐尖或急尖, 基部楔形或圆形; 侧脉每边 8—10 条, 纤细, 两面稍凸起, 网脉不明显; 叶柄长 2—8 毫米。花紫红色, 1—2 朵与叶对生或腋外生; 花梗柔弱, 长 2.5—5.5 厘米, 中部以下通常有小苞片; 簇片卵圆形, 长 2.5—3 毫米, 被缘毛; 花瓣革质, 两面顶端被微毛, 外轮花瓣阔卵形, 长和宽约 1 厘米, 内轮花瓣比外轮花瓣稍小, 内面凹陷; 药隔顶端截形, 有小乳头状凸起; 心皮长圆形, 内弯, 密被黄色柔毛, 柱头马蹄形, 顶端 2 裂, 每心皮有胚珠 6—8 颗。果球形或椭圆状卵圆形, 直径约 1.3 厘米, 成熟时紫红色, 无毛; 果柄细长, 长 4—5.5 厘米, 无毛。花期 5—10 月, 果期 6 月—翌年 4 月。

产于江西、广东和广西。生于丘陵山地疏密林中较湿润的地方。越南也有。本种模式标本采自越南河内。

2. 扣匹(广西龙津) 东京紫玉盘(植物分类学报)

Uvaria tonkinensis Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Francé 53, Mém. 4: 74, Pl. 14a. 1906, et in Lec. Fl. Gén. Indo-Chine 1: 57, Pl. 9A. 1907; 蒋英、李秉滔, 海南植物志 1: 237. 1964.

2a. 扣匹(原变种) 图版 6: 1—8

var. *tonkinensis*

攀援灌木; 小枝被星状柔毛, 后渐无毛。叶纸质, 倒卵状披针形、倒卵形、长圆形或椭圆形, 长 12—21 厘米, 宽 4—7 厘米, 顶端长渐尖或渐尖, 基部圆形或微心形, 叶