中国植物学杂志 2 (3): 704, 图 14. 1935; 陈嵘, 中国树木分类学 324, 图 244. 1937; 蒋英、李秉滔, 海南植物志 1: 239, 图 116. 1964; 中国高等植物图鉴 1: 806, 图 1611. 1972.

直立灌木, 高 1—2 米, 全株无毛。叶膜质, 长圆形至阔椭圆形, 长 9—16 厘米, 宽 3—7 厘米, 顶端急尖或钝, 基部近圆形, 干时灰黄色; 侧脉每边 7—8 条, 纤细, 上面扁平, 下面凸起, 网脉疏距; 叶柄长 6—20 毫米。花小, 1—2 朵与叶对生, 淡绿色, 长约 12 毫米; 花梗长约 6 毫米; 萼片圆形, 外面被毛; 外轮花瓣比内轮花瓣稍长, 卵形, 钝头, 薄膜质, 宽为内轮的 2 倍; 心皮 2—4 个, 卵状长圆形, 被微柔毛, 每心皮有胚珠 2 颗。果聚合状, 腹缝线开裂, 有棒状的柄, 长 2—2.5 厘米, 直径 5—7 毫米, 顶端凸尖; 种子 1—2 颗, 扁, 倒卵形, 长 8 毫米, 宽约 6 毫米, 初时红色, 成熟时黑褐色而有光泽。

果期 10 月—翌年 1 月。

产于广东海南岛和广西。生于中海拔山地密林中。印度、斯里兰卡、泰国、老挝、柬埔寨、越南、菲律宾和印度尼西亚等地也有。本种模式标本采自菲律宾的吕宋岛。

10. 银钩花属* ——**Mitrephora** (Bl.) Hook. f. et Thoms.

(Bl.) Hook. f. et Thoms. Fl. Ind. 1: 112. 1855; R. E. Fries in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, 17a, 2: 136. 1959; Hutch. Gen. Fl. Pl. 1: 98. 1967.——*Uvaria* Linn. sect. *Mitrephora* Bl. Fl. Jav. Anon. 13. 1829.

乔木。叶互生; 羽状脉。花单生或几朵集成总状花序, 腋生或与叶对生, 通常两性花, 有时单性花; 萼片 3, 圆形或宽卵形; 花瓣 6 片, 2 轮, 镊合状排列, 外轮花瓣大于内轮花瓣, 外轮花瓣卵形或倒卵形, 薄膜质, 有脉纹, 内轮花瓣箭头形或铁铲形, 基部有长爪, 上部卵形或披针形, 向内弯拱而边缘稍粘合呈圆球状; 雄蕊多数, 长圆状楔形, 药室外向, 分离, 药隔顶端截形; 心皮通常多数, 长圆形, 花柱长圆形或棒状, 少数花柱极短或不明显, 腹部有槽纹, 每心皮有胚珠 4 至多颗, 2 排。成熟心皮圆球状或卵圆状, 有时长圆状椭圆形, 有柄或近无柄。

约 40 种, 分布于亚洲南部和东南部的热带和亚热带地区至大洋洲。我国产 3 种, 分布于西南和华南。

本属模式种为 Mitrephora obtusa (Bl.) Hook. f. et Thoms.

---

* 银钩花属(中国植物学杂志)。

分种检索表

1.叶柄和叶背均被锈色疏长柔毛，沿脉上更密；侧脉上面凹陷 …… 1.**银钩花 M. thorelii** Pierre
1.叶柄和叶背幼时被疏柔毛，老渐无毛；侧脉上面稍凸起。
2.花两性…… 2.**山蕉 M. maingayi** Hook. f. et Thoms.
2.花单性…… 3.**云南银钩花 M. wangii** Hu

1. 银钩花(中国植物学杂志) 定春(海南东方)；大叶杂古(海南霸王岭) 图版22

Mitrephora thorelii Pierre, Fl. For. Cochinch. 1: tab. 37. 1881; Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Francé 53, Mém. 4: 125. 1906, et in Lec. Fl. Gén. Indo-Chine 1: 91. 1907; Craib, Fl. Siam. Enum. 1: 53. 1925; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 6: 277. 1928; 蒋英，中国植物学杂志 2(3): 694, 图 9. 1935; 陈嵘，中国树木分类学 317, 图 238. 1937; Ast in Humb. Suppl. Fl. Gén. Indo-Chine 1: 101. 1938; 蒋英、李秉滔，海南植物志 1: 242, 图 118. 1964; 朱志淞等，海南主要经济树木 81, 图 16. 1964; 中国高等植物图鉴 1: 807, 图 1613. 1972.

乔木，高达 25 米，胸径达 50 厘米；树皮灰黑色至深灰黑色，韧皮部淡赭色，略有香甜气味；小枝密被锈色绒毛，老渐无毛，灰黑色。叶近革质，卵形或长圆状椭圆形，长达15 厘米，宽 7—10.5 厘米，顶端短渐尖，基部圆形，叶面除中脉外无毛，有光泽，叶背被锈色长柔毛，沿中脉上更密；中脉上面凹下，下面凸起，被锈色长柔毛，侧脉每边 8—14 条，上面凹陷，下面凸起，网脉扁平；叶柄粗壮，长约 7 毫米，密被锈色绒毛。花淡黄色，直径 1—1.5 厘米，单生或数朵组成总状花序，腋生或与叶对生；总花梗、花梗、萼片、花瓣均密被锈色柔毛；总花梗短，有脱落的小苞片痕迹；花蕾圆球状；萼片卵状三角形，长约 3 毫米，内面无毛；外轮花瓣卵形，长约为萼片的 3 倍，内外面均被柔毛，内轮花瓣菱形，下部渐狭成爪，两面均被柔毛，边缘粘合成一帽状体；雄蕊楔形，药隔盘状；心皮被毛，花柱圆柱状，每心皮有胚珠 8—10 颗，2 排。果卵状或近圆球状，成熟时有环纹，长 1.6—2 厘米，直径 1.4—1.6 厘米，密被褐色绒毛；果柄细长，长于果的 2—3 倍，密被褐色绒毛。 花期 3—4 月，果期 5—8 月。

产于广东(海南)和云南南部。生于山地密林中。越南、老挝、柬埔寨、泰国等地也有。本种模式标本采自越南。

木材坚硬，适于作车辆和建筑用材。