

产于云南南部。生于海拔 600—1600 米山地密林中。本种模式标本采自普洱。

11. 金钩花属* —— *Pseuduvaria* Miq.

Miq. Fl. Ned. Ind. 1 (2): 32. 1858; R. E. Fries in

Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, 17a, 2: 134.

1959; Hutch. Gen. Fl. Pl. 1: 98. 1967.

灌木或乔木。叶互生，膜质至革质；叶柄短；羽状脉。花小形，单性，单生或多朵簇生于叶腋内；花萼 3 裂，膜质，裂片镊合状排列；花瓣 6 片，2 轮，每轮 3 片，镊合状排列，膜质，外轮花瓣短于内轮花瓣，外轮花瓣与萼片相似，但比其大，内轮花瓣明显地有窄长的爪，上部卵状三角形，花蕾时向内弯拱，边缘粘合呈帽状体；雄花：雄蕊多数，楔形，内向，药隔顶端截形或微凹；雌花：有时外围有少数退化雄蕊，心皮 3 至多个，每心皮有胚珠 2—5 颗，柱头无柄，顶端近头状。成熟心皮圆球状，无柄或有柄；种子 1 至多颗。

约 17 种，分布于缅甸、泰国、越南、马来西亚、新加坡、印度尼西亚和菲律宾等。我国产 1 种，产于云南。

本属模式种为： *Pseuduvaria reticulata* (Bl.) Miq.

本属与银钩花属 *Mitrephora* Hook. f. et Thoms. 的主要区别在于后者的花大，外轮花瓣大于内轮花瓣。

1. 金钩花(植物分类学报) 图版 25

Pseuduvaria indochinensis Merr. in Journ. Arn. Arb. 19: 28. 1938; R. E. Fries in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, 17a, 2: 134. 1959; 李秉滔, 植物分类学报 14 (1): 104. 1976.

乔木，高 6—20 米；小枝被短柔毛，老渐无毛，灰白色，有纵条纹。叶纸质，长圆形，长 10—23 厘米，宽 3.5—8.5 厘米，顶端渐尖，基部宽楔形至近圆形，叶面亮绿色，除中脉被短柔毛外无毛，叶背蓝绿色，仅中脉和侧脉初时被短柔毛，老渐无毛；中脉上面凹陷，下面凸起，侧脉每边 10—12 条，斜升至近叶缘网结，网脉明显，两面略凸起；叶柄长 3—10 毫米，被短柔毛。雌雄同株异花，花黄色，单生或多朵簇生于叶腋内，有时凋落；花梗细长，长 1—2.5 厘米，被短柔毛，中部有小苞片；小苞片圆形或近圆形，外面被微毛；雄花：萼片圆形，长和宽 1.5—2 毫米，外面被短柔毛；外轮花瓣肾状卵

* 金钩花属(植物分类学报)。