

期几乎全年,果期5月—翌年1月。

产于广东海南岛和云南。生于海拔300—800米山地林中或沟谷中。本种模式标本采自海南岛保亭。

13. 木瓣树属* ——*Xylophia* Linn., nom. cons.

Linn. Syst. ed 10: 1241, 1250, 1378. Mai-Jun. 1759. —

Xylopicrum P. Br. Hist. Jam. 250, 254. 1756.

乔木或灌木。叶互生,排成2列;有叶柄;羽状脉。花单朵或几朵簇生于叶腋内;花梗通常较短,且着生有小苞片;花蕾长尖帽状或钻状,外部有三稜;花萼3裂,厚,裂片镊合状排列,基部或几全部合生成杯状;花瓣6片,2轮,每轮3片,镊合状排列,厚,木质,外轮花瓣比内轮花瓣大,狭长,内凹,彼此靠合,或略为张开,内轮花瓣线状披针形,内面凹,边缘靠合成三棱形;雄蕊多数,长圆形,药室外向,毗连,有横隔纹,药隔三角形或截形,心皮少至多数,离生,花柱伸长,丝状,柱头棍棒状或头状或长圆状,外弯,每心皮有胚珠2—6颗,侧生。成熟心皮长圆状或伸长,种子间有缢缩纹,有柄。

约160种,分布于世界热带及亚热带地区。我国产1种,产于广西。

本属模式种为: *Xylophia muricata* Linn.

1. 木瓣树(植物分类学报) 图版32

Xylophia vielana Pierre, Fl. For. Cochinch. 1: tab. 34. 1881; Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France 53, Mém. 4: 128. 1906, et in Lec. Fl. Gén. Indo-Chine 1: 94. 1907; Ast in Humb. Suppl. Fl. Gén. Indo-Chine 1: 105. 1938; 李秉滔,植物分类学报 14 (1): 104. 1976.

乔木,高达20米;枝条黑褐色,密被圆形皮孔,小枝上部幼嫩时密被短绒毛,老渐几无毛。叶纸质,排成2列,椭圆形或卵圆形,长3—7厘米,宽1.2—3厘米,顶端钝或短渐尖,基部钝或圆形,鲜时淡绿色,干后叶面灰褐色,被紧贴疏短柔毛,叶背褐色,被短绒毛,中脉上面微凹,下面凸起,侧脉每边6—7条,上面扁平,下面略凸起,不很明晰;叶柄长4—8毫米,被短绒毛,老渐几无毛。花单朵腋生,下弯,长约2厘米,直径5—8毫米,花蕾尖帽状,有三稜;花梗2—3毫米,被黄白色短绒毛,基部或近基部有小苞片;小苞片宽卵形,顶端圆形,外面被短毛茸;萼片宽卵圆形或近半圆形,长和宽约4毫米,三分之一下面合生,外面密被黄白色短绒毛,内面无毛;外轮花瓣长圆状

* 木瓣树属(植物分类学报)。