

披针形,长 1.5 厘米,宽 3 毫米,顶端钝,基部宽,截形,厚,木质,内弯,两面密被黄白色短绒毛,内轮花瓣线状披针形,长 1.4 厘米,宽 2 毫米,内面中部中肋凸起呈四菱形,两面被短绒毛;雄蕊长圆形,长 2.5 毫米,药室有横隔纹,药隔长三角形,被短柔毛;心皮长 4 毫米,密被长柔毛,花柱细长,柱头棍棒状,外弯,被长柔毛,每心皮有胚珠 5 颗,侧生。果长圆形或长圆状披针形,两端渐尖,长 2.5—3.5 厘米,直径 8—10 毫米,种子间有缢缩,内有种子 3—5 颗;种子卵圆形;果柄长 1.5 厘米,总果柄长约 1 厘米,有皮孔。花期春夏季,果期夏秋季。

产于广西南部。生于山地林中。越南、柬埔寨也有。本种模式标本采自越南河内。

14. 鹿茸木属* ——*Meiogyne* Miq.

Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. 2: 12. 1865; R. E.

Fries in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, 17a,

2: 96. 1959; Hutch. Gen. Fl. Pl. 1: 95. 1967.

乔木或灌木。叶互生,有柄,羽状脉。花萼 3 裂,裂片基部合生;花瓣 6 片,2 轮,每轮 3 片,镊合状排列,扁平,外轮花瓣稍长于内轮花瓣,或几等长;雄蕊多数,楔形,药隔顶端圆形;心皮 2—7 个,少数有 8—12 个,无柄,通常被毛,每心皮有胚珠多颗,2 排,柱头近头状,无柄。成熟心皮 1—5 个聚生,长圆状、卵圆状或椭圆状,外果皮有缢缩横纹;通常无柄;果内有种子多颗,2 排。

约 9 种,分布于亚洲南部及东南部。我国产 1 种,产于广东海南岛。

本属模式种为: *Meiogyne virgata* (Bl.) Miq.

1. 鹿茸木(植物分类学报) 图版 33

Meiogyne kwangtungensis P. T. Li, 植物分类学报 14 (1): 104, 图 1. 1976.

灌木,高 3 米;树皮灰黑色;嫩枝密被黄色长柔毛,老渐无毛,老枝灰黑色,有纵条纹。叶膜质,长圆形或长椭圆形,长 6—18 厘米,宽 2.5—5.5 厘米,顶端渐尖,基部圆形,有时浅心形,叶面亮绿色,除中脉被短柔毛外无毛,叶背粉白色,被黄色长柔毛;中脉上面凹下,下面凸起,侧脉每边约 10 条,两面凸起,弯拱上升,未达叶缘网结;叶柄长 2—3 毫米,被长柔毛。花淡红色,腋生。果单生或 2—3 个聚生,卵圆形,长 1.8—3 厘米,直径 1—1.5 厘米,顶端有短尖头,基部圆形,外果皮有缢缩横纹,密被黄色绒

* 鹿茸木属(植物分类学报)。



鹿茸木 *Meiogyne kwangtungensis* P. T. Li. 果枝。(陈国泽绘)

毛,无柄;总果柄长 3.5—5 厘米,被疏柔毛;种子 10 颗,2 排。 花期 7 月,果期 7—8 月。

产于广东海南岛。生于海拔 600 米山地林谷中。本种模式标本采自保亭县兴隆榔命田村。

15. 蕉木属* ——*Oncodostigma* Diels

Diels in Bot. Jahrb. 49: 143, fig. 1912; R. E. Fries in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2, 17a, 2: 120, fig. 27. 1959; Hutch. Gen. Fl. Pl. 1: 96. 1967.——*Chieniodendron* Tsiang et P. T. Li, 植物分类学报 9: 374. 1964.

乔木。叶互生,有柄;羽状脉。花两性,1—2 朵,腋生或腋外生,具短梗,基部有小苞片;萼片 3,基部合生;花瓣 6 片,2 轮,每轮 3 片,镊合状排列,肉质,干后革质,内外轮花瓣近等长,而内轮花瓣较外轮花瓣窄些,内凹成瓢状;雄蕊多数,长圆状倒卵形,药隔扩大,顶端截形或近截形;心皮 2—12 个,长圆形,被长柔毛,柱头卵圆状,大形,比子房宽,直立,基部缢缩,顶端全缘,每心皮有胚珠约 10 颗,2 排,腹面着生。成熟心皮椭圆状或长圆筒状或倒卵状,被锈色微绒毛,在种子间有时有缢纹;种子多数,2 排;胚乳丰富,折叠。

约 4 种,分布于我国和马来西亚及印度尼西亚。我国产 1 种,分布于广东(海南)和广西。

本属模式种为: *Oncodostigma leptoneurum*** Diels

Chieniodendron 属的分类位置仍有争论, H. K. Airy Shaw (1973) 认为应归入假鹰爪属 (*Desmos*), 我们认为后者的果实念珠状,胚珠 1 排,与前者的果实单个而不呈念珠状,胚珠 2 排等不同。 J. Sinclair (1953, 根据前者模式种的基本别名)、N. T. Ban (1973) 等人认为应归入 *Meiogyne* 属中, 我们认为后者的花瓣扁平,药隔圆形,柱头基部无缢缩,与前者的花瓣内凹而呈瓢状或囊状,柱头基部缢缩等不同。现我们再查对, *Chieniodendron* 属的特征与 *Oncodostigma* 属最相似,特别是它们的花的大小、形状、质地、花瓣内凹成瓢状、花梗短而基部具小苞片、药

* 蕉木属(中国高等植物图鉴), 别名: 钱木属(海南植物志); 钱氏木属(植物分类学报)。

** 本种加词原是 *leptoneura*, 是阴性。根据国际植物命名法规关于“属名的性别”的辅则 75A 规定, 凡是用 *-stigma* 终结的近代复合词, 应该是中性(1972 年版, 209 页)。因此本属名 *Oncodostigma* 是中性, 其种加词亦应中性, 所以我们改正如上。