

披针形,长 1.5 厘米,宽 3 毫米,顶端钝,基部宽,截形,厚,木质,内弯,两面密被黄白色短绒毛,内轮花瓣线状披针形,长 1.4 厘米,宽 2 毫米,内面中部中肋凸起呈四菱形,两面被短绒毛;雄蕊长圆形,长 2.5 毫米,药室有横隔纹,药隔长三角形,被短柔毛;心皮长 4 毫米,密被长柔毛,花柱细长,柱头棍棒状,外弯,被长柔毛,每心皮有胚珠 5 颗,侧生。果长圆形或长圆状披针形,两端渐尖,长 2.5—3.5 厘米,直径 8—10 毫米,种子间有缢缩,内有种子 3—5 颗;种子卵圆形;果柄长 1.5 厘米,总果柄长约 1 厘米,有皮孔。花期春夏季,果期夏秋季。

产于广西南部。生于山地林中。越南、柬埔寨也有。本种模式标本采自越南河内。

14. 鹿茸木属* ——*Meiogyne* Miq.

Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. 2: 12. 1865; R. E.

Fries in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, 17a,

2: 96. 1959; Hutch. Gen. Fl. Pl. 1: 95. 1967.

乔木或灌木。叶互生,有柄,羽状脉。花萼 3 裂,裂片基部合生;花瓣 6 片,2 轮,每轮 3 片,镊合状排列,扁平,外轮花瓣稍长于内轮花瓣,或几等长;雄蕊多数,楔形,药隔顶端圆形;心皮 2—7 个,少数有 8—12 个,无柄,通常被毛,每心皮有胚珠多颗,2 排,柱头近头状,无柄。成熟心皮 1—5 个聚生,长圆状、卵圆状或椭圆状,外果皮有缢缩横纹;通常无柄;果内有种子多颗,2 排。

约 9 种,分布于亚洲南部及东南部。我国产 1 种,产于广东海南岛。

本属模式种为: *Meiogyne virgata* (Bl.) Miq.

1. 鹿茸木(植物分类学报) 图版 33

Meiogyne kwangtungensis P. T. Li, 植物分类学报 14 (1): 104, 图 1. 1976.

灌木,高 3 米;树皮灰黑色;嫩枝密被黄色长柔毛,老渐无毛,老枝灰黑色,有纵条纹。叶膜质,长圆形或长椭圆形,长 6—18 厘米,宽 2.5—5.5 厘米,顶端渐尖,基部圆形,有时浅心形,叶面亮绿色,除中脉被短柔毛外无毛,叶背粉白色,被黄色长柔毛;中脉上面凹下,下面凸起,侧脉每边约 10 条,两面凸起,弯拱上升,未达叶缘网结;叶柄长 2—3 毫米,被长柔毛。花淡红色,腋生。果单生或 2—3 个聚生,卵圆形,长 1.8—3 厘米,直径 1—1.5 厘米,顶端有短尖头,基部圆形,外果皮有缢缩横纹,密被黄色绒

* 鹿茸木属(植物分类学报)。