

毛,无柄;总果柄长 3.5—5 厘米,被疏柔毛;种子 10 颗,2 排。 花期 7 月,果期 7—8 月。

产于广东海南岛。生于海拔 600 米山地林谷中。本种模式标本采自保亭县兴隆榔命田村。

15. 蕉木属* ——*Oncodostigma* Diels

Diels in Bot. Jahrb. 49: 143, fig. 1912; R. E. Fries in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2, 17a, 2: 120, fig. 27. 1959; Hutch. Gen. Fl. Pl. 1: 96. 1967.——*Chieniodendron* Tsiang et P. T. Li, 植物分类学报 9: 374. 1964.

乔木。叶互生,有柄;羽状脉。花两性,1—2 朵,腋生或腋外生,具短梗,基部有小苞片;萼片 3,基部合生;花瓣 6 片,2 轮,每轮 3 片,镊合状排列,肉质,干后革质,内外轮花瓣近等长,而内轮花瓣较外轮花瓣窄些,内凹成瓢状;雄蕊多数,长圆状倒卵形,药隔扩大,顶端截形或近截形;心皮 2—12 个,长圆形,被长柔毛,柱头卵圆状,大形,比子房宽,直立,基部缢缩,顶端全缘,每心皮有胚珠约 10 颗,2 排,腹面着生。成熟心皮椭圆状或长圆筒状或倒卵状,被锈色微绒毛,在种子间有时有缢纹;种子多数,2 排;胚乳丰富,折叠。

约 4 种,分布于我国和马来西亚及印度尼西亚。我国产 1 种,分布于广东(海南)和广西。

本属模式种为: *Oncodostigma leptoneurum*** Diels

Chieniodendron 属的分类位置仍有争论, H. K. Airy Shaw (1973) 认为应归入假鹰爪属 (*Desmos*), 我们认为后者的果实念珠状,胚珠 1 排,与前者的果实单个而不呈念珠状,胚珠 2 排等不同。 J. Sinclair (1953, 根据前者模式种的基本别名)、N. T. Ban (1973) 等人认为应归入 *Meiogyne* 属中, 我们认为后者的花瓣扁平,药隔圆形,柱头基部无缢缩,与前者的花瓣内凹而呈瓢状或囊状,柱头基部缢缩等不同。现我们再查对, *Chieniodendron* 属的特征与 *Oncodostigma* 属最相似,特别是它们的花的大小、形状、质地、花瓣内凹成瓢状、花梗短而基部具小苞片、药

* 蕉木属(中国高等植物图鉴), 别名: 钱木属(海南植物志); 钱氏木属(植物分类学报)。

** 本种加词原是 *leptoneura*, 是阴性。根据国际植物命名法规关于“属名的性别”的辅则 75A 规定, 凡是用 *-stigma* 终结的近代复合词, 应该是中性(1972 年版, 209 页)。因此本属名 *Oncodostigma* 是中性, 其种加词亦应中性, 所以我们改正如上。

隔近截形、柱头大形,比子房宽而基部缢缩,顶端全缘、胚珠 10 颗而 2 排、果实有柄及种子 2 排等特征完全相符合。只是前者的心皮较多些,果实长圆筒状或倒卵状,不是椭圆状的不同,这是种的差异而不是属的不同。因此,我们将它归并如上,该属的种组合如下。

1. 蕉木(中国高等植物图鉴) 山蕉(海南那大);海南山指甲(中国植物学杂志);钱木(海南植物志);钱氏木(植物分类学报) 图版 34

Oncodostigma hainanense (Merr.) Tsiang et P. T. Li, comb. nov. — *Fissistigma maclurei* Merr. in Philip. Journ. Soc. Bot. 23: 241. 1923, non Merr. op. cit. 21: 342. 1922. — *F. hainanense* Merr. in Journ. Arn. Arb. 6: 131. 1925. — *Desmos hainanensis* (Merr.) Merr. et Chun in Sunyatsenia 2: 229. 1935; 蒋英,中国植物学杂志 2 (3): 690, 图 6. 1935; 陈嵘,中国树木分类学 314, 图 236. 1937. — *Meiogyne maclurei* (Merr.) Sincl. in Gard. Bull. Singap. 14: 41. 1953, p. p. — *Chieniodendron hainanense* (Merr.) Tsiang et P. T. Li, 植物分类学报 9: 375, 图版 36. 1964, 海南植物志 1: 243, 图 119. 1964; 中国高等植物图鉴 1: 807, 图 1614. 1972. — *Meiogyne hainanensis* (Merr.) Ban in Bot. Journ. URSS. 58 (8): 1148. 1973, syn. nov.

常绿乔木,高达 16 米,胸径达 50 厘米;小枝、小苞片、花梗、萼片外面、外轮花瓣两面、内轮花瓣外面和果实均被锈色柔毛。叶薄纸质,长圆形或长圆状披针形,长 6—10 厘米,宽 2—3.5 厘米,顶端短渐尖,基部圆形,除叶柄和叶脉被柔毛外无毛;中脉上面凹陷,下面凸起,侧脉每边 6—10 条,斜升,未达叶缘网结,上面扁平,下面凸起;叶柄长 4—5 毫米。花黄绿色,直径约 1.5 厘米,1—2 朵腋生或腋外生;花梗长 6—7 毫米,基部有小苞片;小苞片卵圆形,长 2—4 毫米;萼片卵圆状三角形,长和宽 4—5 毫米,顶端钝;外轮花瓣长卵圆形,长 14—17 毫米,宽 10—11 毫米,内轮花瓣略厚而短,长 14 毫米,宽 8—9 毫米;雄蕊长 2 毫米;心皮长圆形,密被长柔毛,柱头棍棒状,直立,基部缢缩,顶端全缘,被疏短柔毛。果长圆筒状或倒卵状,长 2—5 厘米,直径 2—2.5 厘米,外果皮有凸起纵脊,种子间有缢纹;种子黄棕色,斜四方形,长 16 毫米;胚小,直立,基生,狭长圆形,长 5 毫米。花期 4—12 月,果期冬季至翌年春季。

产于广东(海南)和广西。生于山谷水旁密林中。本种模式标本采自海南五指山。