

产于广东和云南。生于丘陵山地或低海拔的山地疏林中。越南、老挝、柬埔寨、缅甸、泰国、印度等也有。本种模式标本采自印度。

茎皮含单宁,纤维坚韧,可制麻绳和麻袋等。木材坚硬,适于作农具和建筑用材。

2. 陵水暗罗(中国植物学杂志) 图版 36

Polyalthia nemoralis A. DC. in Bull. Herb. Boiss. 2 (4): 1906. 1904; Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Francé 53, Mém. 4: 92. 1906, et in Lec. Fl. Gén. Indo-Chine 1: 70, fig. 9 (1—4). 1907; Merr. et Chun in Sunyatsenia 5: 59. 1940, 植物分类学报 7: 2. 1958; 蒋英、李秉滔,海南植物志 1: 247. 1964.——*P. oligogyna* Merr. et Chun, l. c. 2: 27. 1935; 蒋英,中国植物学杂志 2 (3): 700. 图 11 乙 1935; 陈嵘,中国树木分类学 320. 1937.


灌木或小乔木,高达 5 米;小枝被疏短柔毛。叶革质,长圆形或长圆状披针形,长 9—18 厘米,宽 2—6 厘米,顶端渐尖,基部急尖或阔楔形,两面无毛,干时蓝绿色;侧脉每边 8—10 条,上面扁平,下面凸起,顶端弯拱而联结,网脉不明显;叶柄长约 3 毫米,被不明显微柔毛。花白色,单生,与叶对生,直径 1—2 厘米;花梗短,长约 3 毫米;萼片三角形,长约 2 毫米,顶端急尖,被柔毛;花瓣长圆状椭圆形,长 6—8 毫米,内外轮花瓣等长或内轮的略短些,顶端急尖或钝,广展,外面被紧贴柔毛;药隔顶端截形,被微毛;心皮 7—11 个,被柔毛,柱头倒卵形,顶端浅 2 裂,被微毛,每心皮有胚珠 1 颗,基生。果卵状椭圆形,长 1—1.5 毫米,直径 8—10 毫米,初时绿色,成熟时红色;果柄短,长 2—3 毫米,被疏粗毛。花期 4—7 月,果期 7—12 月。

产于广东南部至海南岛。生于低海拔至中海拔山地林中荫湿处。越南也有。本种模式标本采自越南河内。

3. 小花暗罗(植物分类学报) 图版 37

Polyalthia florulenta C. Y. Wu ex P. T. Li, 植物分类学报 14 (1): 107, 图 3. 1976.

灌木,高约 2 米;小枝被黄色短柔毛,老渐无毛。叶膜质,长圆状披针形或倒披针形,长 5—14.5 厘米,宽 2.3—4 厘米,顶端钝或渐尖,基部阔楔形,叶面除中脉被疏短柔毛外无毛,暗绿色,叶背被不明显的疏短柔毛,绿白色;侧脉每边 10—13 条,上面扁平,下面凸起,斜升,未达叶缘而弯拱联结;叶柄长 2—4 毫米,被短柔毛。花小,直径约 4 毫米,单朵与叶对生,黄绿色;花梗短,长约 5 毫米,果时梗长 1 厘米,被黄色柔毛,中部有 2 个小苞片;小苞片卵状披针形,长 3.5 毫米,宽 1 毫米,外面被黄色柔毛,内面无毛;萼片卵圆形,长和宽约 2 毫米,外面被黄色柔毛,内面无毛;外轮花瓣比内



陵水暗罗 *Polyalthia nemoralis* A. DC., 1. 花、果枝; 2. 花; 3. 花萼外面观; 4. 外轮花瓣的内面观; 5. 内轮花瓣的内面观; 6. 雌、雄蕊群和花托的纵切面; 7. 雄蕊的背面观; 8. 雄蕊的腹面观; 9. 心皮; 10. 子房的纵切面, 示胚珠着生。(陈国泽绘)