

轮花瓣短,卵状披针形,长 2.5 毫米,宽 1.5 毫米,顶端渐尖,外面被黄色柔毛,内面无毛,凹陷,内轮花瓣扁平,卵圆形,长 3.5 毫米,宽 2 毫米,钝头,基部稍狭,外面被黄色柔毛,内面无毛;雄蕊楔形,长 0.5 毫米,药隔顶端截形,被微毛;心皮 7 个,长圆形,长 0.8 毫米,无毛,每心皮有胚珠 1 颗,基生。果红色,圆球状,直径约 8 毫米,无毛,内有种子 1 颗;果柄长约 3 毫米,被黄色柔毛;总果柄长 1 厘米。 花期 12 月,果期 12 月。

产于云南西南部。生于海拔 1350 米山地林中荫湿处。本种模式标本采自耿马县富肯。

4. 西藏暗罗(植物分类学报) 图版 38


Polyalthia chinensis S. K. Wu et P. T. Li, 植物分类学报 14 (1): 108, 图 4. 1976.

乔木,高约 10 米;树皮灰白色;枝条灰色,有皮孔,有不规则条纹。叶薄纸质,长椭圆形或倒卵状披针形,长 9—13 厘米,宽 2.5—3.8 厘米,顶端急尖,有尾尖,基部楔形至宽楔形,无毛,叶面有光泽;中脉上面扁平,下面凸起,侧脉每边 8—10 条,网脉明显,两面略凸起;叶柄长 5 毫米。花绿色,1—2 朵腋生;花梗长约 7 毫米,纤细,上部略膨大,中部及基部有小苞片;小苞片近半圆形至卵圆形;萼片圆形或宽卵形,顶端圆形;花瓣膜质,内外轮几相等,扁平,线形,长 1.3 厘米,宽 2—3 毫米,无毛;雄蕊多数,药隔顶端圆形或近截形;心皮多数,长圆形,无毛,柱头凸起,每心皮有胚珠 2 颗,基生。 花期 8 月。

产于西藏墨脱地区。生于海拔 1000 米山地山坡阔叶林中。本种模式标本采自西藏墨脱县老墨脱区附近。

5. 暗罗(广东海康) 眉尾木(海南儋县);山观音(海南万宁);老人皮(海南兴隆);鸡爪树(海南海口) 图版 39

Polyalthia suberosa (Roxb.) Thw. Enum. Pl. Zeyl. 398. 1864; Hook. f. et Thoms. Fl. Brit. Ind. 1: 65. 1872; King in Ann. Bot. Gard. Calc. 4: 65, Pl. 77B. 1893; Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Francé 53, Mém. 4: 92. 1906, et in Lec. Fl. Gén. Indo-Chine 1: 70. 1907; Craib, Fl. Siam. Enum 1: 44. 1925; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 5: 78. 1927; 蒋英, 中国植物学杂志 2 (3): 701. 1935; 陈嵘, 中国树木分类学 320. 1937; Ast. in Humb. Suppl. Fl. Gén. Indo-Chine 1: 74. 1938; Sincl. in Gard. Bull. Singap. 14: 298. 1955; 蒋英、李秉滔, 海南植物志 1: 246. 1964. — *Uvaria suberosa* Roxb.



西藏暗罗 *Polyalthia chinensis* S. K. Wu et P. T. Li, 1. 花枝; 2. 花; 3. 雌蕊群和花托; 4. 雄蕊的背面观; 5. 雄蕊的腹面观; 6. 心皮的纵切面, 示胚珠着生。
(冯晋镛绘)