

Pl. Coron. 1: 31, tab. 34. 1785, et Fl. Ind. Carey ed. 2: 667. 1832.—
Guatteria suberosa Dun. Monog. Anon. 128. 1817; Hook. f. et Thoms. Fl.
 Ind. 1: 140. 1855.

小乔木，高达5米；树皮老时栓皮状，灰色，有极明显的深纵裂；枝常有白色凸起的皮孔，小枝纤细，被微柔毛。叶纸质，椭圆状长圆形，或倒披针状长圆形，长6—10厘米，宽2—3.5厘米，顶端略钝或短渐尖，基部略钝而稍偏斜，叶面无毛，叶背被疏柔毛，老渐无毛；侧脉每边8—10条，纤细，上面不明显，下面略明显；叶柄长2—3毫米，被微柔毛。花淡黄色，1—2朵与叶对生；花梗长1.2—2厘米，被紧贴的疏柔毛，中部以下有1小苞片；萼片卵状三角形，长约2毫米，外面被疏柔毛；外轮花瓣与萼片同形，但较长，内轮花瓣长于外轮花瓣约1—2倍，外面被柔毛，内面无毛；雄蕊卵状楔形，药隔顶端截形；心皮卵状长圆形，被柔毛，柱头卵圆形，被柔毛，每心皮有胚珠1颗，基生。果近圆球状，直径4—5毫米，被短柔毛，成熟时果红色；果柄长5毫米，被短柔毛。花期几乎全年，果期6月—翌年春季。


产于广东南部和广西南部。生于低海拔山地疏林中。印度、斯里兰卡、缅甸、泰国、越南、老挝、马来西亚、新加坡和菲律宾等也有。本种模式标本采自印度南部。

本种学名的命名人国内外文献均写为：*Polyalthia suberosa* (Roxb.) Benth. et Hook. f., 其实 G. Bentham et J. D. Hooker 从未做过上述组合。

6. 沙煲暗罗(中国植物学杂志) 山蕉树(海南儋县)；血春藤、滑桃(海南万宁)
 图版 40

Polyalthia consanguinea Merr. in Philip. Journ. Sci. Bot. 23: 243. 1923; 蒋英, 中国植物学杂志 2 (3): 701. 1935; 蒋英、李秉滔, 海南植物志 1: 248. 1964.

乔木，高达12米；树皮灰黑色；小枝密被锈色长柔毛，老枝无毛，有皮孔。叶纸质，长圆状披针形或倒披针形，长10—16厘米，宽2.5—5毫米，顶端钝或短渐尖，基部渐狭而稍偏斜呈浅心形，叶面无毛，叶背沿中脉被短柔毛；侧脉每边10—12条，纤细，上面扁平，下面稍凸起；叶柄长约2毫米，被锈色柔毛。花白色，稍带黄色，微香，1—2朵生于矩状的短枝上；花梗长1—1.8厘米，被短柔毛，近基部生有小苞片2—3个，萼片革质，三角状卵形，长约3毫米，被疏柔毛，顶端钝；内外轮花瓣近等长，长圆形，长10—12.5毫米，宽3—4.5毫米，外面被柔毛，内面无毛，顶端稍钝；雄蕊卵状楔形，药隔顶端近截形，被短柔毛；心皮卵状长圆形，长1.5毫米，被疏柔毛，柱头卵圆形，被疏柔毛，每心皮有胚珠2颗。果近圆球状，直径1—1.5厘米，绿色，无毛，内有



沙煲暗罗 *Polyalthia consanguinea* Merr., 1. 花枝; 2. 花; 3. 除去花瓣的花; 4. 外轮花瓣的内面观; 5. 内轮花瓣的内面观; 6. 雄蕊的背面观; 7. 雄蕊的腹面观; 8. 心皮; 9. 心皮的纵切面; 10. 果序。(吴翠云绘)

种子 2 颗；果柄长 7—20 毫米，有小瘤体。 花期 1—4 月，果期 6 月—翌年 1 月。

产于广东海南岛。 生于中海拔山地密林中。 本种模式标本采自海南那大沙煲岭。

果成熟时味甜，去皮可食。

7. 剑叶暗罗(植物分类学报) 图版 41

Polyalthia lancilimba C. Y. Wu ex p. T. Li, 植物分类学报 14(1): 109, 图 5. 1976.

乔木。树皮灰色；小枝被微毛，老枝无毛。叶纸质，长圆状披针形或倒披针形，长 13.5—24 厘米，宽 4—5 厘米，顶端渐尖或短渐尖，基部阔楔形，叶面无毛，叶背仅中脉上被短柔毛；侧脉每边 10—13 条，上面扁平，下面凸起；叶柄长 2—3 毫米，被短柔毛。花 1—2 朵生于矩状的短枝上；花梗长 5—10 毫米，被短柔毛，基部有小苞片；萼片宽卵形，长 2 毫米，宽 3 毫米，外面被微毛，内面无毛；内外轮花瓣几等长，革质，长圆形，长 6—10 毫米，宽 2.5—4 毫米，顶端钝，外面被柔毛，内面无毛；雄蕊卵状楔形，药隔顶端截形，被微毛；心皮卵状长圆形，被长柔毛，柱头圆头状，被长柔毛，每心皮有胚珠 2 颗。 花期 4—5 月。

产于云南东南部。生于海拔 200 米山地林中。本种模式标本采自河口坝治。

8. 景洪暗罗(植物分类学报) 图版 42: 1—7

Polyalthia cheliensis Hu in Bull. Fan Mem. Inst. Biol. 10: 127. 1940.

乔木，高达 20 米，胸径约 30 厘米；枝条无毛，灰白色。叶纸质，倒披针形，长 9—20 厘米，宽 3.5—7 厘米，顶端短渐尖，基部楔形至近圆形，除中脉被微毛外无毛；侧脉每边 16—20 条，两面凸起；叶柄长约 1 厘米，被微毛，上面有槽。花绿黄色，2—4 朵丛生于矩状的短枝上；花梗长约 4 厘米，被黄褐色绒毛，中部有 1 个被绒毛的小苞片；小苞片卵圆形，钝头；萼片宽三角形，长 5 毫米，外面被绒毛，内面无毛；内外轮花瓣匙形或线形，外轮的长 2.5 厘米，宽 3.5 毫米，外面被微毛，内面几无毛，内轮的长 1.5 厘米，宽 3 毫米，外面被微毛，内面几无毛；药隔顶端截形；心皮被粗毛，柱头头状，被毡毛，每心皮有胚珠 1 颗，基生。

产于云南南部。生于海拔 1060 米山地密林中。本种模式标本采自景洪小勐养。

本种的原始记载叶片为倒披针形，花瓣为匙形。但从原模式产地的标本来看，其叶片在枝上部的为倒披针形，在枝下部的为倒卵形和椭圆形；同号模式标本上的花瓣为线形，顶端渐尖，至于花瓣为匙形的，却不十分明显。因此，从较多标本来看，本种很相似于 *Polyalthia siamiarum* (Ham. ex Hook. f. et Thoms.) Benth. ex Hook.