

毛,亮绿色,叶背几无毛或被极稀疏的褐色微柔毛;侧脉每边8—11条,弯拱上升,未达叶缘联结,干时和网脉一样两面均凸起;叶柄长5—10毫米,初时被紧贴的丝毛,后渐无毛。花大形,黄绿色,直径5—10厘米,单朵生于枝端与叶对生;花梗3—5厘米,被锈色丝毛;萼片大,卵圆形,长和宽1.5—2厘米,外面被疏柔毛,内面密被小茸毛;内外轮花瓣略等大,长达4厘米,宽达3厘米,两面均被短毡毛;雄蕊楔形,药隔顶端截形,被短柔毛;心皮线形,被丝毛,花柱线形,无毛,每心皮有胚珠1颗,基生。果卵状椭圆形,长1—1.5厘米,直径1—1.5厘米,初时绿色,成熟时暗红色,干后灰黑色,无毛,内有种子1颗;果柄长2—7厘米,顶端膨大,被短柔毛,后渐无毛;总果柄粗壮,长4.5—10厘米,直径2.5—5毫米。花期3—8月,果期9月—翌年春季。

产于广东和广西。生于海拔500—1000米山地密林中或疏林中。本种模式标本采自广西金秀。

茎皮纤维坚韧,民间常用来编绳索等。

11. 疣叶暗罗 (植物分类学报)

Polyalthia verrucipes C. Y. Wu ex P. T. Li, 植物分类学报 14 (1): 110. 1976.

乔木,高达12米;枝条灰黑色,无毛。叶膜质,长圆形或长圆状披针形,长10—16.5厘米,宽2.5—5厘米,顶端渐尖,基部阔楔形或钝,两面无毛,两面密生透明疣状体凸起;中脉上面扁平,下面凸起,两面有疣状体凸起,侧脉每边15—18条,纤细,与网脉一样两面均凸起;叶柄长3—7毫米,有横纹凸起。果卵圆状,长2厘米,直径1厘米,无毛,内有种子1颗;种子淡黄色,卵圆形,长1.8厘米,直径8毫米;果柄长5—7毫米,有疣状体凸起;总果柄腋生,长5—7毫米,直径3毫米。果期4—7月。

产于云南南部。生于海拔1000—1800米山地密林中。本种模式标本采自勐海县黑龙潭。

12. 腺叶暗罗 (植物分类学报) 图版42: 8—9

Polyalthia simiarum (Ham. ex Hook. f. et Thoms.) Benth. ex Hook. f. et Thoms. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 63. 1872; King in Ann. Bot. Gard. Calc. 4: 73, Pl. 101. 1893; Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France 53, Mém. 4: 95. 1906, et in Lec. Fl. Gén. Indo-Chine 1: 73. 1907; Craib, Fl. Siam. Enum. 1: 44. 1925; Ast in Humb. Suppl. Fl. Gén. Indo-Chine 1: 77. 1938; 李秉滔,植物分类学报 14 (1): 110. 1976.——*Guatteria simiarum* Ham. ex Hook. f. et Thoms. Fl. Ind. 1: 142. 1855.——*Unona simiarum* Baill. ex