

绿色,密被锈色短毡毛;种子扁平,半月形。花期10月—翌年3月,果期3—8月。

产于广东(海南)、广西和云南。生于海拔500米以下山地常绿阔叶林中。本种模式标本采自海南岛三模掘黎村。

木材坚硬而韧,结构密致均匀,适于建筑、车船等用材。果实成熟时可食。

6. 多脉藤春(植物分类学报) 图版 52

Alphonsea tsangyuanensis P. T. Li, 植物分类学报 14 (1): 112, 图 6. 1976.——*A. lutea* sensu C. Y. Wu et W. T. Wang, 植物分类学报 6: 210. 1957, non (Roxb.) Hook. f. et Thoms.

乔木,高达12米,除花外,全株无毛。叶纸质,长圆形,长6—11厘米,宽2.5—3.5厘米,顶端具尾状渐尖,尾尖长1—1.7厘米,基部宽楔形至钝;中脉上面凹陷,下面凸起,侧脉每边15—19条,密生,上面扁平,下面略凸起。花单朵与叶对生;花梗长3毫米,被微毛;花蕾圆锥状,长1厘米,直径8毫米;萼片三角形,外面被短绒毛,内面无毛;花瓣卵状三角形,外面被短绒毛,内面无毛,外轮的长1厘米,宽6毫米,内轮的长9毫米,宽5毫米;雄蕊多数,3排,长1.5毫米,药隔顶端有短尖;心皮4—5个,稍扁,长圆形,被长硬毛,每心皮有胚珠5颗,2排,花柱极短,柱头顶端2裂。花期4月。

产于云南南部。生于海拔1450米山地密林中。本种模式标本采自沧源。


本种与 *Alphonsea lutea* (Roxb.) Hook. f. et Thoms. 的不同,在于前者的叶两面均无毛,侧脉每边15—19条,密生,心皮4—5个,每心皮有胚珠5颗,柱头顶端2裂。而后者的叶背中脉和侧脉被微毛,侧脉每边8—10条,心皮10个,每心皮有胚珠10颗,柱头顶端全缘等不同。

19. 依兰属*——**Cananga** (DC.) Hook. f. et Thoms., nom. cons.

(DC.) Hook. f. et Thoms. Fl. Ind. 1: 129. 1855, non Aubl. (1775).——*Unona* Linn. sect. *Unonaria* DC. subsect. *Cananga* DC. Prod. 1: 90. 1824.——*Fitzseraldia* F. Muell. Fragm. 6: 1. 1867.——*Canangium* Baill. Hist. Pl. 1: 213. 1868.

乔木或灌木。叶互生,大形;羽状脉;有叶柄。花大,单生或几朵丛生于腋内或腋外的总花梗上;萼片3,镊合状排列;花瓣薄,6片,2轮,每轮3片,镊合状排列,内外

* 别名: 夷兰属(种子植物名称),加拿楮属(中国植物学杂志)。



多脉藤春 *Alphonsea tsangyuanensis* P. T. Li, 1. 花枝; 2. 花; 3. 花蕾; 4. 外轮花瓣的内面观; 5. 内轮花瓣的内面观; 6. 除去花瓣的花; 7. 雄蕊的腹面观; 8. 雄蕊的背面观; 9. 雄蕊的侧面观; 10—11. 心皮和心皮的纵切面, 示胚珠着生。(陈国泽绘)