

茎皮纤维坚韧,云南民间用其编织绳索或作点火绳。

7. 排骨灵(云南) 满山香(云南);多苞瓜馥木(植物分类学报) 图版 63

Fissistigma bracteolatum Chatterjee in Kew Bull. 1948: 58. 1948; 吴征镒、王文采,植物分类学报 6: 206. 1957; 蒋英、李秉滔,植物分类学报 10: 320. 1965.

攀援灌木,长达 10 米;茎灰黑色;枝条被褐色绒毛,老渐无毛,有皮孔。叶革质,卵状长圆形、椭圆状长圆形或倒卵状长圆形,长 9—17.5 厘米,宽 3.2—7.5 厘米,顶端急尖,有小尖头,基部圆形,叶面除中脉被粗毛外无毛,叶背被褐色粗毛;侧脉每边 16—20 条,斜升至叶缘,上面凹陷,下面凸起;叶柄长 1—1.3 厘米,被粗毛。花黄色,多朵丛生成团伞花序;总花梗长 3—7 毫米;花梗长 1—1.5 厘米,被黄褐色短绒毛,基部或中部有小苞片;小苞片比萼片长或等长,长圆状卵圆形,长 5—6 毫米,宽 3—4 毫米,外面被褐色短绒毛,内面无毛;萼片卵圆形,长 5 毫米,宽 3—4 毫米,外面被短绒毛,内面无毛;外轮花瓣卵状三角形,长 13—15 毫米,宽 7—8 毫米,外面密被黄色短绒毛,内面无毛,内轮花瓣卵状披针形,长 10—11 毫米,宽 4—5 毫米,外面被短柔毛,内面无毛;药隔卵状三角形;心皮卵状长圆形,长约 3 毫米,密被粗毛,柱头顶端 2 裂,每心皮有胚珠 8 颗,2 排。果圆球状,直径约 1.5 厘米,被短绒毛;果柄长约 3 厘米。花期夏季,果期秋冬季。

产于云南南部和西部。生于海拔 1000—1800 米的山地林谷中或山谷路旁潮湿林中。缅甸也有。本种模式标本采自缅甸东北部。

根皮药用,有舒筋、活血、消炎和止血,主治外伤出血、骨折、跌打损伤。

本种原记载叶背被绒毛,但我们看到的同号模式标本 (G. Forrest 26562),其叶背被粗毛,不是被绒毛。我国云南植物的叶背也是被粗毛。

8. 大叶瓜馥木(新拟)

Fissistigma latifolium (Dun.) Merr. in Philip. Journ. Sci. Bot. 15: 132. 1919, et in Univ. Calif. Pubic. Bot. 15: 72. 1929; Back. et Bakh. Fl. Java 1: 114. 1963.——*Unona latifolia* Dun. Monog. Anon. 115. 1817.——*Melodorum latifolium* (Dun.) Hook. f. et Thoms. Fl. Ind. 1: 117. 1855, et in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 79. 1872.

攀援灌木;嫩枝密被棕褐色柔毛,老枝被毛少。叶纸质,长圆形、长椭圆形或倒卵形,长 13—35 厘米,宽 5—15 厘米,顶端急尖,基部圆形,叶面被微毛,叶背被褐色短柔毛,脉上较密;中脉和侧脉在叶面凹陷,在叶背显著凸起,侧脉每边 18—22 条,与中



排骨灵 *Fissistigma bracteolatum* Chatterjee, 1. 花枝; 2. 花; 3. 外轮花瓣的内面观; 4. 内轮花瓣的外面观; 5. 内轮花瓣的内面观; 6. 花除去花萼和花瓣, 示雌蕊和雄蕊的着生; 7. 雄蕊的背面观; 8. 雄蕊的腹面观; 9. 心皮; 10. 心皮的纵切面, 示子房内的胚珠着生。
(黄少容绘)