

陷,在叶背凸起,侧脉每边 16—22 条,网脉两面均不明显;叶柄长 1—1.5 厘米。长圆锥花序与叶对生或顶生;总花梗长达 28 厘米;小苞片 1—2 个,阔三角形,被红色绒毛;花蕾卵圆形,长约 1.1 厘米;萼片阔三角形,长 4 毫米,宽 3 毫米,内面无毛;外轮花瓣卵状椭圆形,长 1.1 厘米,宽 5 毫米,内面无毛,内轮花瓣卵状长圆形,长 8 毫米,宽 4 毫米;药隔长三角形;心皮长圆形,被绢质柔毛,柱头顶端 2 裂,每心皮有胚珠 10 颗,2 排。 花期 10 月。

产于广东海南岛西部。生于山地疏林中。本种模式标本采自东方县春曰岭。

13. 凹叶瓜馥木(植物分类学报) 头序瓜馥木(植物分类学报) 图版 67


Fissistigma retusum (Lév.) Rehd. in Journ. Arn. Arb. 10: 191. 1929; Lauener in Not. Bot. Gard. Edinb. 24: 73. 1962; 蒋英、李秉滔,植物分类学报 10: 322, 图版 61. 1965.——*Melodorum retusum* Lév. in Fedde Rep. Spec. Nov. 9: 459. 1911, et Fl. Kouy-Tchéou 29. 1914.——*F. capitatum* Merr. ex Li in Journ. Arn. Arb. 26: 60. 1945; 吴征镒、王文采,植物分类学报 6: 204. 1957; 蒋英、李秉滔,植物分类学报 9: 380. 1964, 海南植物志 1: 252. 1964.

攀援灌木;小枝被褐色绒毛。叶革质或近革质,广卵形、倒卵形或倒卵状长圆形,长 9—26 厘米,宽 4.5—13 厘米,顶端圆形或微凹,基部圆形至截形,有时呈浅心形,叶面仅中脉和侧脉被短绒毛,叶背被褐色绒毛;侧脉每边 15—20 条,在叶面凹陷,在叶背凸起,网脉明显,与侧脉近垂直网结;叶柄长 8—15 毫米,被短绒毛,上面有槽。花多朵组成团伞花序,花序与叶对生;总花梗长 5—10 毫米;几无花梗;萼片卵状披针形,长约 1 厘米,花蕾时与花瓣等长,顶端渐尖,外面被短绒毛,内面无毛;外轮花瓣卵状长圆形,长约 1.5 厘米,外面被短绒毛,内面无毛,内轮花瓣卵状披针形,比外轮花瓣短,基部稍内弯,两面无毛;药隔阔三角形;心皮长 1.5 毫米,密被绢质柔毛,花柱长圆形,内弯,被柔毛,柱头顶端全缘,每心皮有胚珠 4 颗,2 排。果圆球状,直径约 3 厘米,被金黄色短绒毛;果柄长 1.5 厘米,被金黄色短绒毛。 花期 5—11 月,果期 6—12 月。

产于西藏、贵州、云南、广西和广东(海南)。生于山地密林中。本种模式标本采自贵州独山。

14. 上思瓜馥木(植物分类学报) 藤蕉(广西防城) 图版 68

Fissistigma shangtzeense Tsiang et P. T. Li, 植物分类学报 10: 324, 图版 63. 1965.



凹叶瓜馥木 *Fissistigma retusum* (Lév.) Rehd., 1. 花枝; 2. 萼片的内面观; 3. 外轮花瓣的内面观; 4. 内轮花瓣的内面观; 5. 雄蕊的背面观; 6. 雄蕊的腹面观; 7. 心皮; 8. 心皮的纵切面, 示子房的胚珠着生; 9. 成熟心皮。(邓盈丰绘)