

攀援灌木，长达8米；幼枝、叶背、叶柄、总花梗、花梗、萼片外面和外轮花瓣外面均密被黄褐色柔毛，老枝无毛，有皮孔。叶纸质，倒卵形或倒卵状长圆形，有时椭圆形，长3—13厘米，宽2—5.5厘米（最大的达25×8厘米），顶端圆形或微凹，有时钝头，基部阔楔形，有时圆形，叶面除中脉被黄褐色柔毛外无毛；侧脉每边13—20条，在叶面凹陷，在叶背凸起；叶柄长约1.5厘米。团伞花序腋外生，有花2—5朵；总花梗长达6毫米；小苞片卵圆形，长和宽约1毫米，着生于花梗的中部或基部；萼片阔三角形，长5毫米，宽3毫米；外轮花瓣卵圆形，长1厘米，宽6毫米，内面被疏柔毛，内轮花瓣长圆形，长6毫米，宽2毫米，外面被疏柔毛，内面无毛；药隔斜三角形；心皮密被绢质长柔毛，柱头顶端全缘，每心皮有胚珠10颗，2排。果长圆形，长4厘米，直径2厘米，密被赤褐色毡毛；种子长圆形，直径5毫米，亮黑色；果柄长约2厘米。花期7—10月，果期10月—翌年5月。

产于广西南部。生于山地林中。本种模式标本采自上思十万大山。

15. 多脉瓜馥木(植物分类学报)

Fissistigma balansae (A. DC.) Merr. in Philip. Journ. Sci. Bot. 15: 130. 1919; 李秉滔, 植物分类学报 14 (1): 111. 1976.——*Melodorum balansae* A. DC. in Bull. Herb. Boiss. 1070. 1904.

攀援灌木；小枝被褐色短柔毛。叶长圆形或长圆状椭圆形，长14—22.5厘米，宽5.5—10厘米，顶端急尖或钝，基部圆形，叶面除中脉和侧脉被短柔毛外无毛，叶背被褐色短柔毛；侧脉每边25—35条，上面扁平，下面凸起，网脉明显，与侧脉近垂直网结；叶柄粗壮，长8—12毫米，密被褐色短柔毛，上面有槽，叶腋内有长圆形被褐色短柔毛的芽。团伞花序与叶对生或顶生，被短绒毛；花梗短；花长6毫米；萼片三角形，外面有毛，内面无毛；花瓣三角形，厚，外面被短绒毛，内面凹陷而被毛；雄蕊楔形，有时卵状三角形；心皮被毛，每心皮有胚珠6—7颗，2排。

产于云南东南部。生于山地林中。越南也有。本种模式标本采自越南河内。

16. 毛瓜馥木(中国树木分类学) 思藤子(海南澄迈) 图版69

Fissistigma maclurei Merr. in Philip. Journ. Sci. Bot. 21: 342. 1922, et in Lingnan Sci. Journ. 5: 78. 1927; 蒋英, 中国植物学杂志 2 (3): 691. 1935; 陈嵘, 中国树木分类学 315. 1937; 蒋英、李秉滔, 海南植物志 1: 251. 1964, 植物分类学报 9: 379. 1964, et 10: 318. 1965, non Merr. op. cit. 23: 341. 1923.——*Melodorum maclurei* (Merr.) Ast in Humb. Suppl. Fl. Gen. Indo-Chine 1: 111. 1938.——*Meiogyne maclurei* (Merr.) Sincl. in Gard.