

厘米,宽4—6厘米,先端锐尖或短渐尖,基部下延状渐尖,表面密被细的泡状小颗粒,背面苍白色,微被白粉;侧脉8—12对;叶柄长约3厘米。果近圆球形,直径约2.5厘米。

产于我国台湾省南部的兰屿。菲律宾也有分布。

本种未见到标本,仅依据金平亮三、李惠林分别编著的《台湾树木志》及中国科学院北京植物研究所主编的《中国高等植物图鉴》的描述。

4. 肉豆蔻(开宝本草) 肉果、玉果(广西) 图版 88

Myristica fragrans Houtt. Handleid Hist. Nat. Linn. 2: 333. 1774; Warb. Monog. Myrist. 458. 1897; Uphof in Engl. et Prantl. Nat. Pflanzenfam. ed. 2, 17a: 2: 213 1959; Whitm. Trees Fl. Mal. 1: 341. 1972.

小乔木;幼枝细长。叶近革质,椭圆形或椭圆状披针形,先端短渐尖,基部宽楔形或近圆形,两面无毛;侧脉8—10对;叶柄长7—10毫米。雄花序长1—3厘米,无毛,着花3—20,稀1—2,小花长4—5毫米;花被裂片3(—4),三角状卵形,外面密被灰褐色绒毛;花药9—12枚,线形,长约雄蕊柱的一半;雌花序较雄花序为长;总梗粗壮,着花1—2朵;花长6毫米,直径约4毫米;花被裂片3,外面密被微绒毛;花梗长于雌花;小苞片着生在花被基部,脱落后残存通常为环形的疤痕;子房椭圆形,外面密被锈色绒毛,花柱极短,柱头先端2裂。果通常单生,具短柄,有时具残存的花被片;假种皮红色,至基部撕裂;种子卵珠形;子叶短,蜷曲,基部连合。

原产马鲁古群岛,热带地区广泛栽培。我国台湾、广东、云南等地已引种试种。


本种为热带著名的香料和药用植物,产地用假种皮捣碎加入凉菜或其他腌渍品中作为调味食用;种子含固体油,可供工业用油,其余部分供药用,治虚泻冷痢、脘腹冷痛、呕吐等;外用可作寄生虫驱除剂,治疗风湿痛等。

3. 风吹楠属*——*Horsfieldia* Willd.

Willd. Sp. Pl. 4: 872. 1805; Uphof in Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, 17a, 2: 208. 1959; Hutch. Gen. Fl. Pl. 1: 152. 1967.

常绿乔木。叶坚纸质或薄革质,通常无毛,背面不带白粉;侧脉近边缘处联结,第三次小脉网状,通常几不明显。雄花序腋生,通常疏散,常成复合的圆锥状,花不成

* 属的异名: 荷斯非木属(海南植物志、中国植物科属辞典), 假玉果属(中国植物科属检索表、中国高等植物图鉴), 争光树(云南民间通称)。



肉豆蔻 *Myristica fragrans* Houtt., 1. 着果枝; 2. 雄花序; 3. 雄花剖面放大;
4. 雌花剖面放大; 5. 果实剖面。(刘桢绘)