

花期5—8月,果期7—11月。

产于广东(海南)和广西南部。生于海拔400—450米的山谷、丘陵荫湿的密林中。

本种据 J. Sinclair (in Gard. Bull. Singap. 28: 75. 1975) 认为与 *H. kingii* (Hook. f.) Warb. 非常相似,但依据不够确切,未作充分肯定,归并入本种中是不恰当的。本种与 *H. kingii* 的区别点为小枝具明显的皮孔;叶较小,成长圆状宽披针形;雄花序的花密集,几成团,被锈色的星状绒毛;花药20枚;雌花裂片3—5;果通常单生,有宿存不规则的花被片等特征与该种有较大的区别。

4. 大叶风吹楠(云南植物志) 图版92

Horsfieldia kingii (Hook. f.) Warb. Monog. Myrist. 308. 1897; Uphof in Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, 17a, 2: 210. 1959; Whitm. Trees Fl. Mal. 1: 229. 1972; J. Sincl. in Gard. Bull. Singap. 28: 74. 1975; 云南省植物研究所,云南植物志 1: 10. 1977.——*Myristica kingii* Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 106. 1886; King in Ann. Roy. Bot. Gard. Calc. 3: 300, Pl. 127. 1891.

乔木,高6—10米;小枝髓中空,皮层棕褐色,幼时光滑,疏生长椭圆形小皮孔,无毛。叶坚纸质,倒卵形或长圆状倒披针形,长(12—)28—55厘米,宽(5—)15—22厘米,先端锐尖,有时钝,基部渐狭,成宽楔形,除有时中肋被微柔毛外,其余两面无毛;侧脉14—18对,中肋表面下陷成深沟槽,背面微隆起,侧脉至近边缘处多数分叉网结,第三次小脉稀疏,近平行,互相网结,几不明显;叶柄长(1.5—)2.5—4厘米,宽2—3(—5)毫米,具深沟槽,无毛。雄花序腋生或通常从落叶腋生出,长9—15厘米,被疏而短的微绒毛,分枝稀疏,花几成簇,球形;花梗细,略与花等长或近等长;花被2—3裂,裂片阔卵形,先端锐尖;花药12枚,合生成球形;雌花序短,长3—7厘米,多分枝,花近球形,比雄花大,不密集;花被片2或3深裂;子房倒卵球形,被绒毛,柱头无柄。果长圆形,两端渐狭,长4—4.5厘米,中部直径约2.5厘米,盘状花被裂片肥厚,宿存,围绕在果的基部,果外面无毛;果皮厚,革质;假种皮薄,完全包被种子;种子长圆状卵球形,顶端微尖;种皮厚,光滑无毛,具光泽,褐色。果期10—12月。

产于云南盈江、瑞丽、龙陵、沧源、景洪等地。生于海拔800—1200米的沟谷密林中。锡金、印度东北部、孟加拉也有分布。

本种的叶在国产种中最大,成上部最宽、下部渐狭的倒卵形或长圆状披针形,花被裂片2—3,果实具宿存肥厚的盘状花被管等特征易于区别。

5. 风吹楠(广西) 埋央壤(云南西双版纳傣语); 枯牛(云南西盟佤语); 丝迷罗



大叶风吹楠 *Horsfieldia kingii* (Hook. f.) Warb., 1. 着雄花枝; 2. 雄花和雄花剖面放大; 3. 果实。(刘柯绘)