

米,先端尾状渐尖,基部窄楔形下延,革质,上面榄绿色,有光泽,下面灰白色或黄褐色,无毛,中脉上面凹下成窄沟,下面明显凸起,侧脉每边8—10条,上面不显著,下面凸起,网脉在两面上均不明显;叶柄长6—10毫米。圆锥花序2—9个近顶生,长2—4厘米,无毛或有微柔毛;总梗长1—3厘米;花梗长3—5毫米;花被裂片两面有微柔毛,外轮的卵圆形,长1.6—2毫米,内轮的卵形,长约3毫米;雄蕊长约2毫米,花丝无毛,第三轮花丝基部有毛且具2个无柄球形腺体,退化雄蕊箭头形,长1毫米,有短柄;子房无毛,花柱纤细,长1毫米。果球形,直径8毫米。

产广西南部。

55. **短序润楠** 短序桢楠(海南植物志),较树、白皮槁(广东)

Machilus breviflora (Benth.) Hemsl. in Journ. Linn. Soc. 26: 374. 1891; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. 10: 224. 1912; Lec. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris. 5^e Ser. 5: 98. 1913; Chun in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China 1 (5): 23. 1925; Liou Ho, Laur. Chine et Indoch. 54. 1932 et 1934; 陈嵘, 中国树木分类学, ed. 2, 343. 1957. 侯宽昭等, 海南植物志 1: 269. 1964.——*Alseodaphne breviflora* Benth. Fl. Hongkong. 292. 1891.——*Persea breviflora* (Benth.) Pax in Engl. u Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3: 115. 1889; Kosterm. in Reinwardtia 6: 191. 1962.

乔木,高约8米;树皮灰褐色。小枝咖啡色,渐变灰褐色。芽卵形,长约5毫米,芽鳞有绒毛。叶略聚生于小枝先端,倒卵形至倒卵状披针形,长4—5厘米,极少长至9厘米,宽1.5—2厘米,先端钝,基部渐狭,革质,两面无毛,干时下面稍粉绿或带褐色,中脉上面凹入,下面凸起,侧脉和网脉纤细;叶柄长3—5毫米或更短。圆锥花序3—5个,顶生,无毛,有长总梗,花枝萎缩,常呈复伞形花序状,长2—5厘米;花梗短,长约3—5毫米;花绿白色,长约7—9毫米,外轮花被裂片较小,结果时花被裂片宿存,有时脱落;第一、第二轮雄蕊长约2毫米,第三轮雄蕊稍较长,腺体具短柄;退化雄蕊箭头形,有柄,柄上有小柔毛;雌蕊长约1.8毫米。果球形,直径约8—10毫米。花期7—8月,果期10—12月。

产广东(海南)、广西。生山地或山谷阔叶混交疏林中,或生于溪边。

56. **华润楠** 桢南(海南植物志),黄槁、八角楠、荔枝槁(广东海南)

Machilus chinensis (Champ. ex Benth.) Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 374. 1891; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. 10: 224. 1912; Lec. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, 5^e Ser. 5: 98. 1913; Chun. Chinese Econ. Trees 160. 1921; et in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China 1 (5): 22. 1925; Liou Ho, Laur. Chine et Indoch. 54. 1932 et 1934; Merr. et Chun in Sunyatsenia 2: 234. 1935; 侯宽昭等, 广州植物志 89. 1956; 陈嵘, 中国树木分类学, ed. 2, 342. 1957; 中国高等植物图鉴 1: 824, 图 1648. 1972.——*Alseodaphne chin-*