

54. 1979.

花被外面有小柔毛或绢毛;果大或较大,直径 1.3 厘米以上;花常较大。

亚组 1. 暗叶润楠亚组——Subsect. 1. *Melanophyllae* S. Lee

果卵形,外轮花被裂片常较小。

本亚组我国产 1 种。

58. 暗叶润楠

Machilus melanophylla H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. 17 (2): 54, pl. 8,

f. 3. 1979.

乔木,高 15 米。枝条棕褐色,常染有黑色斑,皮层纵裂,初被黄褐色微柔毛,后变无毛。芽小,近圆锥形,有黄褐色绒毛。叶椭圆形,长 8—13 厘米,宽 2.5—5 厘米,先端近短渐尖,尖头钝,基部楔形,革质,上面无毛,下面褐色,疏被黄色微柔毛,中脉上面凹陷,下面凸起,侧脉每边 8—10 条,上面平坦,下面凸起,横脉及小脉纤细,稠密网状,上面不明显,下面明显;叶柄长 1—1.2 厘米,略被黄褐色微柔毛,黑褐色。圆锥花序近顶生,长 3.5—9 厘米,自中部或中部以上分枝,总梗长 2.5—4 厘米,与各级序轴及果梗密被黄褐色微柔毛;苞片及小苞片早落。花未见。果卵球形,长达 2.2 厘米,宽达 1.8 厘米;宿存花被片长圆形,先端锐尖,不等大,外轮长 5 毫米,宽 2 毫米,内轮长 8 毫米,宽 1.8 毫米,两面密被黄褐色微柔毛;果梗增粗,径达 2 毫米。果期 7 月。

产云南南部。生海拔 800 米次生林潮湿处。

亚组 2. 枇杷叶润楠亚组——Subsect. *Globosae* S. Lee in Act. Phytotax. Sin. 17 (2): 55. 1979.

果球形;花被裂片等大或不等大。

本亚组我国产 10 种。

59. 枇杷叶润楠 图版 16: 1

Machilus bonii Lec. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, 5^e Ser. 5: 58 et 102. 1913; Fl. Gén. Indoch. 5: 121. 1914; et in Not. Syst. 3: 12. 1914; Liou Ho, Laur. Chine et Indoch. 50. 1932 et 1934.——*Persea bonii* (Lec.) Kosterm. in Reinwardtia 6: 191. 1962; et in ibid. 8: 118. 1970, quoad nomen tantum.

乔木,高达 20 米。枝条近圆形,具棱角,幼时多少压扁,皮层灰白色,脱落,无毛。叶互生,疏离,倒卵形或长倒卵形至倒披针形,长 13—22 厘米,宽 5.5—7.5 (9) 厘米,先端短渐尖,基部楔形,近革质,上面绿色,无毛,下面黄褐绿色,多少密被黄褐色柔毛,中脉在上面凹陷,下面凸起,侧脉每边多达 16 条,上面近平坦,下面凸起,横脉和小脉在两面结成网