

被短而硬的毛,上面具槽,长3—5毫米。花序被柔毛,长3—7厘米,自下部1/3呈圆锥状分枝。花黄色,被微柔毛,具梗;花被裂片不相等,稍肉质,两面被柔毛,外轮3枚卵圆形,长2.5毫米,内轮3枚宽卵圆形,长3.5毫米;能育雄蕊9,花丝被柔毛,花药卵圆形,先端钝,第一、二轮雄蕊长约2.5毫米,内向,第三轮雄蕊长约2.8毫米,外向,具2腺体,腺体有短柄,着生于花丝基部;退化雄蕊3,略被柔毛,先端箭头形,长约2毫米;雌蕊无毛,长2.7毫米,子房近球形,花柱颇大,比子房长,柱头大,盘状。果未见。(标本未见,摘自原描写)产四川(城口)。生于海拔约1000米的阔叶林中。

5. 樟果樟属——*Caryodaphnopsis* Airy Shaw

Airy Shaw in Kew Bull. 1940: 74. 1940; Kosterm. in Journ. Sci. Res. Indonesia 1: 151 (=39). 1952; Commum. Fer. Res. Inst., Bogor 57: 33. 1957; in Reinwardtia 4: 225. 1957; et in ibid. 9 (1): 123. 1974; C. Y. Wu et W. T. Wang in Act. Phytotax. Sin. 6 (2): 212—215. 1957; Bernardi, Lauraceas 15. 1963.

灌木或小至中等大乔木。枝条圆柱形,有时因略具棱角而多少呈扁四棱形。叶对生或近对生,卵形至卵状长圆形,薄革质,具离基三出脉,具柄。花两性,排列成常为横出的狭而细长的腋生圆锥花序;苞片及小苞片均细小。花被筒极短或近于无,花被裂片6,脱落,外轮细小,三角形,开张,内轮大得多,宽三角状卵圆形,镊合状。能育雄蕊9,或为棒状长圆形而花丝不明显,或花药呈正方形而花丝明显且呈扁平向,花药4室,偶亦有各轮花药均2室或仅第一、二轮花药2室,第一、二轮药室内向,第三轮药室外向或侧外向,第一、二轮花丝无腺体,第三轮花丝基部有一对近无柄的腺体。退化雄蕊3,位于最内轮,微小,箭头形,具短柄。子房卵珠形,花柱短,柱头不明显,2—3裂。果大,倒卵珠形或长椭圆状球形,梨果状,坚硬,亮绿色,外果皮薄膜质,中果皮肉质,常分解,内果皮软骨质;果梗多少增厚,顶端膨大。种子大,硬,形状与果同。

约7种,分布于我国云南以及老挝、越南北部至马来西亚的沙巴及菲律宾。我国有4种,均产于云南南部。

分种检索表

1. 枝条、叶柄及叶下面密被黄褐色短柔毛……………1. 巴围樟果樟 *C. baviensis* (Lec.) Airy Shaw
1. 枝条、叶柄及叶下面无毛或近无毛。
 2. 花序及花被外面近无毛或幼时略被短柔毛;花小,直径2—3毫米,内轮花被片内面略被短绒毛……………2. 小花樟果樟 *C. henryi* Airy Shaw
 2. 花序及花被外面多少明显被短柔毛或短绒毛;花较大,直径3.5—5(6)毫米,内轮花被片内面密被短绒毛。

3. 叶卵圆状长圆形, 长(10)15—19厘米, 宽4.5—8.5厘米; 圆锥花序长(3)4—13厘米; 内轮花被片长3—3.5毫米……………3. 椴果樟 *C. tonkinensis* (Lec.) Airy Shaw
3. 叶常呈椭圆形或圆状椭圆形, 稀为长圆形, 长20—28.5(30)厘米, 宽(8)10—16.5厘米; 圆锥花序长14—25厘米; 内轮花被片长1.7—2.5毫米……………4. 宽叶椴果樟 *C. latifolia* W. T. Wang

1. 巴围椴果樟 巴围假椴果(植物分类学报) 图版22: 1—9

Caryodaphnopsis baviensis (Lec.) Airy Shaw in Kew Bull. 1940: 76. 1940; Kosterm. in Journ. Sci. Res. Indonesia 1: 151. 1952, et in Reinwardtia 9(1): 127. 1974; C. Y. Wu et W. T. Wang in Act. Phytotax. Sin. 6(2): 214. 1957. — *Nothaphoebe baviensis* Lec. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, 5^e Sér. 5: 107. 1913; et Fl. Gén. Indoch. 5: 118. 1914; Liou Ho, Laur. Chine et Indoch. 77. 1932 et 1934. — *Persea baviensis* (Lec.) Kosterm. in Journ. Sci. Res. Indonesia 1: 139. 1953.

乔木, 高5—10米。枝条粗壮, 圆柱形, 褐色, 无毛, 幼枝纤细, 密被短柔毛, 具细条纹。叶对生或近对生, 卵圆状长圆形, 长9—19(22)厘米, 宽(4.5)5—10厘米, 先端短渐尖或渐尖, 基部宽楔形至近圆形, 坚纸质, 上面暗褐色, 无毛, 下面苍白色, 密被短柔毛, 边缘增厚, 平坦或微内卷, 具三出脉或离基三出脉, 中脉纤细, 在上面凹陷, 下面凸起, 侧脉3—4对, 斜展, 但最基部一对侧脉离叶基0—6毫米处自中脉近于直伸, 并向上延伸至叶片中部以上, 其余侧脉在叶片近中部或中部以上自中脉生出, 通常互生, 稀近对生, 十分弧曲, 近叶缘消失, 横脉自侧脉生出, 与细脉网结, 各级脉均在下面凸起; 叶柄长0.8—2厘米, 腹凹背凸, 密被短柔毛。圆锥花序腋生, 狭长而纤细, 长(3)7—14厘米, 密被锈色短柔毛, 具短分枝, 分枝对生或近对生, 横向, 末端为近伞房状的3—7花的聚伞花序; 苞片及小苞片细小, 钻形, 长1—2毫米, 被锈色短柔毛。花淡黄色或黄色, 开花时直径约3毫米; 花梗纤细, 长1.5—2毫米, 密被锈色短柔毛。花被裂片6, 外轮细小, 三角形, 长不及1毫米, 外被微柔毛, 内面无毛, 内轮大得多, 宽卵圆状三角形, 长2—2.5毫米, 宽约2毫米, 近锐尖, 稍厚, 外密被贴生锈色微柔毛, 内密被锈色短绒毛。能育雄蕊9, 花药药室数目不固定, 通常各轮花药的药室均为4室, 但亦有的个体各轮花药的药室均为2室, 或第一、二轮者为2室而第三轮者为4室, 第一轮雄蕊长约1.5毫米, 内弯, 花药椭圆状棒形, 药室内向, 花丝被柔毛, 第二轮雄蕊与第一轮者相似, 但稍短而宽, 花药药室亦为内向, 第三轮雄蕊狭长, 花药近长圆形, 药室近于侧向或外侧向, 花丝基部有一对近于无柄的腺体。退化雄蕊箭头状三角形, 具短柄, 被毛。子房近球形, 无毛, 花柱短, 柱头不明显3裂。果未见。花期4—5月。

产云南东南部。生于次生杂木林或路旁开旷灌丛中, 海拔300—1200米。越南北部也有。

2. 小花椴果樟 亨利假椴果(植物分类学报) 图版22: 10—16