

- 色;叶椭圆形或披针状椭圆形,长6.5—8.5厘米,宽2.5—4.5厘米,干后上面灰绿色,下面紫褐色,叶下面网脉较上面密,叶柄细瘦,长1—2厘米……………31. 琼楠 *B. intermedia* Allen
32. 叶基不沿叶柄下延。
33. 叶侧脉每边6—8条,叶厚革质或革质。
34. 叶厚革质,卵圆形至长圆形,长10—18厘米,宽4.5—7厘米,上面平滑,网脉模糊;果椭圆形,长约3.5厘米,直径约1.8厘米,常具瘤状小凸点;小枝粗壮;顶芽特大,长达10毫米,宽达8毫米……………32. 西畴琼楠 *B. sichouensis* H. W. Li
34. 叶厚革质或革质,长椭圆形或椭圆形,长8—15(19)厘米,宽3—6(8)厘米,上面网脉明显凸起,干后两面深褐色或黑褐色,光亮;果长椭圆形,长4—5.5厘米,直径约1.5—2.5厘米,常微偏斜,平滑,黑褐色或暗褐色。
35. 花被无毛……………33a. 厚叶琼楠 *B. percoriacea* Allen var. *percoriacea*
35. 花被内面略被短柔毛,边缘具白色小缘毛……………
- ……………33b. 缘毛琼楠(变种) *B. percoriacea* Allen var. *ciliata* H. W. Li
33. 叶侧脉每边8—13条,叶革质。
36. 叶长9—21厘米,宽3—6厘米,侧脉每边8—13条,干后上面绿褐色;果椭圆形,先端无细尖头……………34. 李榄琼楠 *B. linocieroides* H. W. Li
36. 叶长7—14厘米,宽2—5厘米,侧脉每边10条,叶干后茶褐色;果椭圆形,先端具细尖头……………35. 横县琼楠 *B. henghsienensis* S. Lee et Y. T. Wei

1. 柱果琼楠 图版34: 1—2

Beilschmiedia cylindrica S. Lee et Y. T. Wei in Act. Phytotax. Sin.

17(2): 63, pl. 3, f. 1. 1979.


通常灌木至小乔木。枝条灰白色,略具条纹。幼枝、顶芽密被黄褐色绒毛。叶互生或近对生,纸质,倒卵形、倒卵状长圆形或长椭圆形,长15—24厘米,宽7—11厘米,先端短尖、短尾状渐尖、钝或近圆形,基部阔楔形至近圆形,干时上面灰褐色,下面变褐色或紫褐色,在放大镜下可见密布微小的带白色斑点和微小的突起,中脉上面下陷,下面凸起,侧脉每边12—16条,下面较上面明显凸起,近叶缘处相联结,侧脉之间有横脉连结,两面中脉、侧脉上多少被黄褐色短柔毛,小脉疏网状,两面稍凸起;叶柄长7—13毫米,密被黄褐色绒毛或后变无毛。花序未见。果序短;果圆柱状,长达5厘米,直径约1.5厘米,成熟时黑色,有明显的皱褶及散生极小的瘤状小凸点;果梗变粗,粗约3毫米。 果期1月。

产云南(屏边大围山)。常生于山谷林中。

本种叶大,倒卵形、倒卵状长圆形或长椭圆形,枝条灰白色,幼枝、顶芽密被黄褐色绒毛,果圆柱状,长达5厘米,直径约1.5厘米,极易区别。

2. 网脉琼楠 牛奶奶果(云南) 图版32: 1

Beilschmiedia tsangii Merr. in Lingnan Sci. Journ. 13: 27. 1934; Ilen in Journ. Arn. Arb. 23: 453. 1942; 海南植物志 1: 280. 1964; C. E. Chang Alin Fl. Taiwan 2: 407, 1976.——*B. formosana* C. E. Chang in Bull. Taiwan Prov. Pingt. Inst. Agr. 7: 87. 1966; et in ibid. 11: 49. 1970; Liu, Lign. Pl.



1—2. 柱果琼楠 *Beilschmiedia cylindrica* S. Lee et Y. T. Wei: 1. 果枝, 2. 叶背面观。3. 美脉琼楠 *B. delicata* S. Lee et Y. T. Wei: 果枝。(刘宗汉、何顺清绘)