

色,两端浑圆,表面光滑,无毛;果梗粗壮,直径3—6毫米,长1—3.5厘米。果期2—12月。

产广东(海南)、广西。常生于海拔500—900米的山坡和山谷密林中。越南也有分布。

本种木材坚硬,宜作梁、柱、桁、门窗、天花板、家具和农具用材。

8. 红毛琼楠

Beilschmiedia rufohirtella H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. 17(2): 63, pl. 11, f. 4. 1979.

乔木,高5—25(30)米。幼枝多少压扁,具棱和细纵条纹,多少被锈色微硬毛。叶互生、对生或近对生,坚纸质,椭圆形至长圆形,长11—23厘米,宽3.6—10.2厘米,先端短渐尖至渐尖,有时锐尖、钝或微缺,常偏斜,基部宽楔形至近圆形,边缘软骨质,干时上面黑褐色,下面茶褐色,密被腺状小凸点,幼时两面密被锈色微硬毛,老时上面仅沿中脉及侧脉被锈色微硬毛或变无毛,下面网脉多少被锈色微硬毛,中脉和侧脉上面微凸或平,在下面明显凸起,侧脉每边9—12条,斜展,小脉两面明显,网状;叶柄长1—2.5厘米,幼时密被锈色微硬毛,后变无毛。聚伞状圆锥花序腋生或近顶生,长1.8—3厘米;总梗与各级序轴密被锈色微硬毛;苞片及小苞片倒卵形,长达3毫米,宽2毫米,也被微硬毛;花黄色,长约3.5毫米;花梗长2—5毫米;花被裂片宽卵圆形,长2.5毫米,宽2毫米。果椭圆状长圆形,长4.5—5.5厘米,直径2.5—2.7厘米,两端渐狭,顶端具小尖头,成熟时紫黑色,无毛;果梗粗短,长5毫米,顶端粗4—5毫米。花、果期12月至次年3月。

产云南东南部。生于海拔1100—1700米的沟边灌丛或阔叶林中。

9. 海南琼楠

Beilschmiedia wangii Allen in Journ. Arn. Arb. 23: 452. 1942, excl. Lau 25637; 海南植物志 1: 279. 1964; Liou Ho, Laur. Chine et Indoch. 105. 1932 et 1934.

乔木,高达16米;树皮灰色,幼枝多少压扁。芽被锈色短柔毛。叶对生,近革质或纸质,椭圆形、阔椭圆形或椭圆状披针形,长9—14厘米,宽3.5—7厘米,先端钝或短渐尖,基部近圆形或急尖,两侧常不对称,上面无毛,下面有细密腺状小凸点或被微柔毛或近无毛,中脉上面平坦,侧脉每边约8—9条,上面较纤细,下面较粗,小脉纤细,密网状,两面稍凸起;叶柄长1.2—2.5厘米,常有瘤状小凸点。圆锥花序近顶生或腋生,长4—8厘米,被锈色短柔毛;分枝下部的苞片短,近倒卵形或披针形,长约2.5毫米;花长约4—5毫米,白色;花梗长约1厘米;花被裂片椭圆形,长约3毫米,被黄棕色短柔毛,并有腺状斑点;果长椭圆形,长5.5厘米,直径约2.2厘米,紫黑色或黑色;果梗长达2.5厘米,粗约5毫米。花期11月至次年3月。

产广东、广西、云南。常生于混交密林中或溪边灌木丛中。越南也有分布。