

各部密被灰黄色短柔毛；花小；花梗长约 1 毫米；花被裂片卵圆形，长约 1.5 毫米；能育雄蕊 9 枚。果椭圆形，长 4—5 厘米，直径 2—3 厘米，干后黑褐色，平滑，两端近圆形，先端有小凸点；果梗粗壮，长 5—20 毫米，直径达 7 毫米，常有褐斑。 花、果期 8 月。

产西藏东南部、云南。常生于山坡常绿阔叶林中。印度、锡金、缅甸也有分布。

Allen 在《阿诺德树木园杂志》23: 451. 1942. 中曾例举刘心祈 3147、27404；冯钦 20123 作为稠琼楠 *B. roxburghiana* Nees，经我们核对，这三号标本的顶芽、幼枝、叶均无毛，与稠琼楠的特征不符，而与 *B. percoriacea* Allen 一致，应为后者。

12. 少花琼楠

Beilschmiedia pauciflora H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. 17(2): 64, pl. 11, f. 5. 1979.

乔木，高 14 米；树皮灰色。枝条粗壮，灰褐色，具疣状突起，无毛。顶芽细小，与幼枝多少被短柔毛。叶对生或互生，长椭圆形至倒卵形，通常长 20 厘米，宽 6 厘米，先端钝、圆形或微缺，稀锐尖至短渐尖，基部楔形而渐狭，薄革质，干时上面灰褐色或绿褐色，下面有极细腺状小凸点，暗晦，两面无毛，中脉上面平坦或在中下部微陷，侧脉每边约 11 条，斜升，两面多少明显，小脉疏网状两面多少明显；叶柄长 5—15 毫米。花序聚伞状，腋生或近顶生，短小，长 1—2 厘米，具 1—3 花；总梗长 1 厘米，被黄褐色短柔毛；花白色，开花时直径可达 5 毫米；花梗长 2—7 毫米；花被裂片椭圆状披针形，长 3 毫米，宽约 1 毫米，被短柔毛，具透明腺点；能育雄蕊 6 枚，与花被片对生，长约 3 毫米，花药长圆形，长约 1 毫米，药室均内向，花丝被短柔毛，每在花被片凹缺处下方有一圆状肾形无柄腺体，退化雄蕊圆状肾形，具短柄；子房近球形，略被短柔毛。果未见。 花期 3—4 月。

产云南南部。生于海拔 550—1000 米的山坡或沟底的疏林或密林中。


13. 保亭琼楠 图版 33: 9

Beilschmiedia baotingensis S. Lee et Y. T. Wei in Act. Phytotax. Sin. 17(2): 64, pl. 3, f. 2. 1979.

小乔木，高 4—12 米；树皮褐色。小枝被灰褐色微毛或无毛，具细密皮孔。顶芽细小，密被黄褐色短柔毛。叶对生或近对生，革质，椭圆形，稀椭圆状披针形，长 6—10 厘米，宽 2—4 厘米，多少偏斜，先端短渐尖，微弯，稀圆形、钝或凹缺，基部楔形，常不等侧，背面密被极小的腺状小凸点，干后叶上面灰褐色，下面紫黑色，中脉上面微凸，侧脉每边 7—8 条，少有更多，两面凸起，小脉疏网状，两面略凸；叶柄长 0.5—1 厘米。花序未见。果序腋生，长 2—3 厘米；果圆球形，直径约 1.8 厘米，密被褐色糠秕；果梗长 4—7 毫米，粗 2—3 毫米。 果期 7 月。

产广东(海南)。常生于山谷阔叶混交林中。

本种与纸叶琼楠 *B. pergamentacea* Allen 较近似，但本种的叶及叶柄较短，芽、幼枝密被灰褐色短柔毛，果为圆球形，可以区别。



1—8.山蒲 *Beilschmiedia appendiculata* (Allen) S. Lee et Y. T. Wei: 1.花枝, 2.花被片, 背面观, 3.花被片, 腹面观, 4.第一轮雄蕊, 腹面观, 5.第一轮雄蕊, 背面观, 6.第二轮雄蕊, 7.退化雄蕊, 8.子房。9.保亭琼楠 *B. baotingensis* S. Lee et Y. T. Wei: 果枝。(何顺清绘)