

14. 山潺 梅乐樟 图版 33: 1—8

Beilschmiedia appendiculata (Allen) S. Lee et Y. T. Wei in Act. Phytotax. Sin. 17 (2): 65. 1979. — *Lauromerrillia appendiculata* Allen in Journ. Arn. Arb. 23: 460. 1942; Kosterm. in Journ. Sci. Res. Indonesia 1: 151. 1952, pro syn.; 海南植物志 1: 278. 1964, pro syn.

乔木, 高 6—30 米, 胸径可达 60 厘米; 树皮灰黄色。顶芽密被灰褐色短绒毛。小枝无毛或被微柔毛, 常粗壮, 微具棱角。叶对生或互生, 椭圆形、长椭圆形, 稀倒卵形, 长 5—11 厘米, 宽 2—4.5 厘米, 先端钝、钝渐尖、圆形或有时微缺, 基部楔形或阔楔形, 两面无毛, 干时上面绿褐色至灰褐色, 上面或有时下面密被腺状小凸点, 中脉上面平坦或微凸, 基部常微凹, 侧脉每边 7—10 条, 两面凸起, 网脉纤细, 疏网状, 在两面凸起; 叶柄长 5—18 毫米, 纤细。圆锥花序腋生, 长 1—2 厘米, 被短柔毛; 花黄色; 花梗长约 4 毫米; 花被裂片 6 间或 8 枚, 椭圆形, 长约 1.8 毫米; 能育雄蕊 6 枚, 间或 8 枚; 退化雄蕊 3(4) 枚, 长约 1.2 毫米。果椭圆形、卵状椭圆形, 长 1—1.8 厘米, 直径约 1 厘米, 常具小瘤, 未成熟时绿色, 成熟后黑色; 果梗粗 1.5—2 毫米。花期 2—3 月, 果期 5—7 月。

产广东(海南)。常生于山谷路边疏林中或溪边。

Allen 建立梅乐樟属 *Lauromerrillia* Allen 时曾指出, 该属与琼楠属很接近, 但花的构造不同, 能育雄蕊 6 枚。我们检查过刘心祈 3535 (*Lauromerrillia appendiculata* Allen 的副模式标本), 发现雄蕊有 6 枚, 间有 8 枚的, 花被裂片亦有 6 间 8 的变异。而在樟科的一些属中亦有花构造变异的情况。因此, 作者认为梅乐樟属 *Lauromerrillia* Allen 以归并于琼楠属 *Beilschmiedia* 为宜。

15. 隐脉琼楠

Beilschmiedia obscurinervia H. T. Chang, 中山大学学报自然科学版 1960 (1): 23. 1960.

小乔木, 高约 5 米。小枝圆形。顶芽细小, 与幼枝略被稀疏微毛。叶常聚生于枝梢, 互生或有时近对生, 革质, 长椭圆状披针形或长圆形, 稀为长卵状披针形, 长 5—11 厘米, 宽 2—4 厘米, 先端渐尖, 尖头钝, 基部宽楔形或近圆形, 无毛, 干后绿褐色, 中脉在两面均凸起, 侧脉每边 6—8 条, 不明显, 网脉极细密, 干后呈极细密的蜂巢状小窝穴; 叶柄长 6—12 毫米。花序未见。果序圆锥状, 长 3—7 厘米; 果椭圆形, 长 2—3.5 厘米, 直径 1—1.7 厘米, 两端尖, 先端常有脐状凸起, 表面平滑, 有细小糠秕, 干后暗褐色; 果梗长 5—7 毫米, 粗约 2 毫米。果期 8 月。

产广西南部(十万大山)。通常生于海拔 900 米左右的混交林中。

16. 东方琼楠

Beilschmiedia tungfangensis S. Lee et L. Lau in Act. Phytotax. Sin. 8 (3): 194. 1963; 海南植物志 1: 276. 1964.