

乔木，高达25米，胸径60厘米；树皮红褐色或灰褐色。小枝纤细，灰褐色，有圆形开裂的皮孔。顶芽细小，被灰黄色微柔毛。叶聚生于枝梢，互生或对生，革质，椭圆形或长椭圆形，长6—9(12)厘米，宽2—3(5)厘米，先端短渐尖，尖头钝，稀为渐尖或钝，基部楔形，干后带褐色，中脉在两面同样凸起，侧脉每边4—7条，两面略凸，常在近叶缘处弯曲且与邻近侧脉相联结，小脉极纤细而密，干后在上面呈极细小的蜂巢状小窝穴，在背面通常较疏而明显；叶柄纤细，长6—15毫米。总状花序腋生或顶生，长约1.5厘米，疏被灰黄色短柔毛；花少，常数朵，黄色，花梗长1.5—3毫米，基部有苞片1枚，与花丝均被毛，花被裂片卵圆形，被柔毛，花被筒下有线形小苞片2枚。果椭圆形，长2.5—4厘米，直径2—2.5厘米，平滑，光亮，两端圆形，熟后黑褐色；果梗长5—10毫米，粗3—4毫米。花期7月，果期9—11月。

产广东(海南尖峰岭)。生于山谷溪边密林中。

17. 滇琼楠 滇拜士密木

Beilschmiedia yunnanensis Hu in Bull. Fam Mem. Inst. Biol. 5: 306. 1934; Hu et Chun, Icon. Pl. Sin. 4: 11. 1935; Allen in Journ. Arn. Arb. 23: 447. 1942; 海南植物志 1: 277. 1964.

乔木，高达18米，胸径可达1米；树皮灰黑色。小枝粗壮，常有棱、纵纹和明显皮孔，干时黑褐色。顶芽常小，密被锈褐色绒毛。叶互生，稀近对生或对生，阔椭圆形，稀椭圆状披针形，常偏斜，长8—16(18)厘米，宽4—6(7.5)厘米，先端渐尖，微弯，基部阔楔形，微沿叶柄下延，两面无毛，中脉上面平坦或凸起，侧脉每边5—9条，两面明显凸起，小脉纤细，密网状，干后两面构成蜂巢状小窝穴，灰褐色或黑褐色；叶柄长1—2.5厘米，粗壮。圆锥花序顶生或腋生，长2—6厘米，稀更长，少花，各级序轴粗壮，密被锈褐色绒毛；苞片阔卵形，长达5毫米；花梗长2—4毫米，密被锈褐色绒毛；花被裂片卵形或阔卵形，与花丝密被短柔毛。果阔椭圆形或近圆形，长2—4厘米，直径1.5—2.7厘米，熟时黑色；果梗长3—4毫米，粗2—4毫米。花期常1—2月，果期5—12月。

产广东、广西西南至东南部、云南南部。常生于海拔800—1900米的山地、溪旁密林中。

18. 美脉琼楠 图版34: 3

Beilschmiedia delicata S. Lee et Y. T. Wei in Act. Phytotax. Sin. 17 (2): 65, 1979.

灌木或乔木，高4—20米；树皮灰白色或灰褐色。小枝近圆形，无毛或薄被短柔毛，常具皮孔。顶芽小，密被灰黄色短柔毛或绒毛。叶互生或近对生，革质，长7—12厘米，宽2—4厘米，很少更长或更宽，多少偏斜，先端渐尖，稀短尖或有时钝，基部楔形或阔楔形，两面无毛或下面有微小柔毛，中脉在两面明显凸起，侧脉每边8—12对，小脉密网状，纤细，两面明显凸起；叶柄长8—13毫米，无毛或被微毛。聚伞状圆锥花序腋生或顶生，长