

2 厘米,常有腺状小凸点。花序总状或圆锥状,腋生,长 3—4 厘米,近无毛;总梗长 1 厘米,花梗长 5 毫米;花被裂片近圆形,长 1.5 毫米,有灰白色毛;花丝、退化雄蕊通常被短柔毛。果序粗壮;果长圆状椭圆形,两端圆形,长 3—4.3 厘米,直径 2—2.5 厘米,干时黑色或黑紫色,常有细微的小凸点,顶端有细尖头;果梗长 1—2.5 厘米,粗 4—6 毫米,灰褐色,有皱纹。花期 8 月,果期 10—11 月。

产广东(海南)、广西、云南东南部。常生于山谷疏林或密林中。

23. 粗壮琼楠

Beilschmiedia robusta Allen in Journ. Arn. Arb. 23: 447. 1942.

乔木,高达 25 米,全株无毛;树皮灰白色,平滑。小枝粗壮,红褐色。顶芽大,卵珠形。叶对生或互生,革质,披针形、椭圆形或长椭圆形,微偏斜,长 (4.5)7—13 厘米,宽 2.5—5 厘米,先端钝或短渐尖,尖头钝,基部楔形,干时上面绿褐色或灰褐色,下面暗褐色或紫黑色,常密被腺状微小凸点,中脉在上面下陷,至少在中部以下下陷,下面凸起,侧脉每边 9—13 条,纤细,网脉通常下面较上面密,两面均凸起;叶柄长 1—2.5 厘米。圆锥花序腋生或近顶生,长达 6 厘米,少花;花被裂片卵圆形,具腺状斑点。果倒卵形或近陀螺状,长约 3 厘米,成熟时紫黑色;果梗粗壮,直径 4—6 毫米。花期 4—5 月,果期 6—11 月。

产西藏、云南和广西。常生于海拔 1000—2400 米,湿润的山地沟谷,疏林或密林中。

24. 长柄琼楠 图版 36: 2

Beilschmiedia longipetiolata Allen in Journ. Arn. Arb. 23: 450. 1942; 海南植物志 1: 276. 1964. — *B. obovalifolia* auct. non Lec.; Merr. et Chun in Sunyatsenia 5: 64. 1940.

乔木,高 10—20 米,树皮绿褐色,全株无毛。顶芽卵形或近球形。叶常聚生于枝梢,对生或近对生,革质或近厚革质,椭圆形、长椭圆形,稀倒卵形,通常长 8 厘米左右,少为更短 (5 厘米) 或更长 (14 厘米),宽 2.5—4.5 厘米,先端圆形,基部楔形或阔楔形,微沿叶柄下延,边缘略背卷,上面光亮,干后暗褐色,中脉在叶面平坦或微凸,侧脉每边约 6 条,侧脉及网脉在两面均凸起;叶柄长 1—2.5 厘米。圆锥花序顶生,长达 3 厘米;花白带黄色 (据采集记录);花梗长约 3 毫米;花被裂片椭圆形,长约 2 毫米,有明显腺状斑点。果椭圆形或近球形,长 2—4 厘米,直径 1.5—3 厘米,干时黑褐色,常有褐斑;果梗长约 8 毫米,粗 3—5 毫米。花、果期 7—11 月。

产广东(海南)。常生于山地或山坡混交林中。

25. 粉背琼楠

Beilschmiedia glauca S. Lee et L. Lau in Act. Phytotax. Sin. 8 (3): 193. 1963; 海南植物志 1: 277. 1964.

25a. 粉背琼楠(原变种)