

或近对生,薄革质,长圆形或长圆状椭圆形,长7—14厘米,宽3—6厘米,先端锐尖或略钝,基部楔形或近圆形,上面绿色,晦暗,下面浅绿色或稍带褐色,干后上面灰褐色,中脉上面下陷,下面凸起,侧脉每边7—9条,侧脉及网脉在两面微凸;叶柄长8—15毫米。圆锥花序数个聚生于枝顶,长约2厘米,无毛;花梗纤细,长3—5毫米;花白带紫色;花被裂片卵形,长2毫米。果近倒卵状椭圆形,或幼时近圆形,长3.2厘米,直径2厘米,暗褐色,密被糠秕状鳞片;果梗粗约4毫米。花期3月,果期7—8月。

产广西南部(十万大山)、广东(信宜、茂名)。常生于山谷杂木林中。

本种稍近似网脉琼楠 *B. tsangii* Merr., 但网脉疏网状,顶芽无毛,果远较大,较长。

30. 贵州琼楠 图版 37: 2

Beilschmiedia kweichowensis Cheng in Not. For. Res. Inst. Centr. Univ. Nanking, Dendrol. Ser. 1: 1—3. 1947.

小乔木。小枝纤细,粗约2毫米,黄褐色,平滑无毛。顶芽椭圆状披针形,平滑无毛。叶对生,革质,长椭圆形或卵状椭圆形,长5—8厘米,稀达10厘米,宽2—3.5厘米,先端尾状长渐尖,微弯,稀短渐尖或钝,基部楔形或阔楔形,很少近圆形,上面深绿色,具光泽,下面浅绿,干后两面褐色,中脉在上面下陷,下面凸起,侧脉纤细,每边8—9条,在两面微凸,小脉网状,较密而明显,纤细;叶柄细瘦,长7—10毫米。花序未见。果序长约1—8.5厘米,无毛;果卵圆形或圆球形,长2.5—3厘米,直径2.3—2.5厘米,褐色,平滑;果梗纤细,粗约1.5毫米。果期10月。

产广西、贵州、四川。常生于山地密林中。

本种与广东琼楠 *B. fordii* Dunn 较接近,但叶较短小,先端尾尖,侧脉及网脉明显凸起,果卵圆形或圆球形,较大,可以区别。

31. 琼楠(海南植物志) 荔枝公(广东海南东方)

Beilschmiedia intermedia Allen in Journ. Arn. Arb. 23: 448. 1942; S. Lee in Act. Phytotax. Sin. 8 (3): 193. 1963; 中国高等植物图鉴 1: 833. 图 1666. 1972; 海南植物志 1: 278. 1964.——*B. discolor* Allen in Journ. Arn. Arb. 23: 448. 1942; S. Lee in l. c. 193. 1963.——*B. grandiosa* Allen in Journ. Arn. Arb. 23: 449. 1942; S. Lee in l. c. 193. 1963.——*B. obovalifolia* auct. non Lec.; Liou Ho, Laur. Chine et Indoch. 107. 1932 et 1934, quoad specim. Ching 8407.

乔木,高9—20余米,胸径60—100厘米;树皮灰色至灰褐色,全株无毛。顶芽多为卵圆形,无毛。叶对生或近对生,革质,椭圆形或披针状椭圆形,长6.5—8.5(—11)厘米,宽2.5—4.5厘米,先端钝或为短渐尖,尖头钝,基部楔形或近圆形,微沿叶柄下延,中脉上面或至少在中下部微下陷,侧脉每边通常6条,稀8条,与网脉均在两面凸起,但网脉下面较



1. 广东琼楠 *Beilschmiedia fordii* Dunn: 果枝。2. 贵州琼楠 *B. kweichowensis* Cheng: 果枝。3. 横县琼楠 *B. henghsiensis* S. Lee et Y. T. Wei: 果枝。(刘宗汉绘)