

上面的密,上面亮绿色,背面浅绿色,干后上面灰绿色,下面紫褐色;叶柄细瘦,长1—2厘米。圆锥花序腋生或顶生,长1.5—2厘米,少花;花绿白色;花梗长2—3毫米;花被裂片椭圆形,长约2毫米,有密集而显著的线状斑点。果长圆形或近橄榄形,长3—4.5(6)厘米,直径1.5—2.5(3)厘米,成熟时黑色或黑褐色,有细微小瘤;果梗长约1厘米,粗3—7毫米,两端不膨大。花期8—11月,果期10月至次年5月。

产广东、广西。常散生于海拔400—1300米的山谷和山腰的缓坡上或在水边和溪旁。越南也有分布。

本种为材用树种,木材结构细致均匀,适作梁、柱、桁板和较好的家具及农具用材。

32. 西畴琼楠

Beilschmiedia sichourensis H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. 17(2): 67, pl. 12, f. 3. 1979.

乔木,高约7米。顶芽大,卵珠形,无毛。当年生枝条压扁,具棱角,下部红褐色,上部淡褐色,无毛。叶厚革质,对生,卵圆形至长圆形,长10.5—18厘米,宽4.5—7.2厘米,先端锐尖至短渐尖,基部楔形,干时上面黄褐色,下面变褐色或紫褐色,两面无毛,中脉上面下陷,下面十分凸起,侧脉每边约8条,斜展,与网状小脉上面模糊,下面稍明显;叶柄长1—1.5厘米。果序腋生,长约4厘米,序轴粗壮,粗达4毫米,红褐色,无毛。果椭圆形,长约3.5厘米,直径1.8厘米;果梗红褐色。果期10月。

产云南东南部。生于海拔300—1500米的混交林中。

33. 厚叶琼楠

Beilschmiedia percoriacea Allen in Journ. Arn. Arb. 23: 450. 1942; 海南植物志 1: 278. 1964; 中国高等植物图鉴 1: 834. 图1667. 1972. — *B. roxburghiana* auct. non Nees; Liou Ho, Laur. Chine et Indoch. 110. 1932 et 1934.

33a. 厚叶琼楠(原变种)

var. *percoriacea*

乔木,高15—18米,胸径可达1.5米;树皮灰褐色或黑褐色,全株无毛。小枝粗壮,略压扁,有条纹。顶芽卵圆形,革质。叶对生或近对生,厚革质或革质,长椭圆形或椭圆形,长9—15(19)厘米;宽4.5—6(8)厘米,微偏斜,先端通常短渐尖,尖头钝,基部楔形,上面光亮,干后深褐色或黑褐色,中脉在上面凹下,侧脉每边6—9条,两面明显凸起,网状脉明显凸起,叶缘波状,略背卷;叶柄粗壮,长1.2—2厘米。花序圆锥状或总状,数个聚生于枝顶,长1.5—5厘米,粗壮;花梗长约5—10毫米;花被裂片卵形或卵圆形,长1.5—2毫米。果长椭圆形,长4—5.5厘米,直径约1.5—2.5厘米,有时稍偏斜,幼时绿色,成熟时暗红色或黑褐色,平滑;果梗长5—8毫米,粗3—5毫米,两端不膨大。花期5月,果期6—12月。

产广东(海南)、广西和云南。常生于山坡密林中。